

Une maladie, de multiples mesures

LES DARTRES L'hiver et le début du printemps nous apportent leur lot de mycoses cutanées. Une fois l'affection installée dans le troupeau, ce n'est souvent qu'au prix de médicaments que l'on arrive à la déloger. Une hygiène et des mesures de désinfection rigoureuses sont ensuite essentielles pour prévenir toute réinfection. De bonnes conditions de détention préviennent de nouvelles attaques.



Matthias Roggli

Les dartres bovines, ou teignes, sont parmi les maladies cutanées les plus fréquentes. Elles touchent principalement les génisses. Dans plus de 90 % des cas, le champignon «*Trichophyton verrucosum*», qui vit dans la peau des animaux, en est la cause. La transmission a lieu par contact direct ou indirect, les vecteurs pouvant être aussi bien les mouches, gales, araignées ou poux que les rongeurs ou des objets. Les spores demeurent infectieuses durant plusieurs années dans l'environnement. Le risque important de lésions durables de la peau d'une part, le recul de l'appétit, du développement ou des performances d'autre part, demandent d'agir rapidement.

Bovins, chevaux et êtres humains L'infestation par les dartres débute généralement en hiver ou au début du printemps, le plus souvent au niveau de la tête, pour s'étendre ensuite au reste du corps. Les parties atteintes présentent une forme caractéristique circulaire.

Puis les poils tombent et il se forme une croûte gris-blanc. Les fortes démangeaisons entraînent un léchage mutuel des zones affectées. Les dartres bovines peuvent aussi se transmettre aux chevaux. Les symptômes sont presque identiques à ceux des bovins: chute passagère des poils sur la tête et sur le tronc, suivie de la formation de petites ampoules au contenu clair comme de l'eau, qui percent et sèchent en 5 à 10 jours.

Les moutons sont rarement touchés, par contre les dartres sont une zoonose et se transmettent aussi à l'homme.



Pour se protéger d'une contamination, quelques mesures de précaution s'imposent lorsque l'on s'occupe d'animaux infectés.

Lutte Les animaux affaiblis étant particulièrement réceptifs à l'infection, il est important de créer de bonnes conditions de garde pour prévenir celle-ci. Cependant, on n'arrive souvent pas à empêcher une infection; une fois qu'elle est installée, il importe de se

protéger soi-même au même titre que les animaux sains. Nous vous présentons ci-dessous un aperçu des mesures préventives possibles et des mesures de gestion des dartres:

- Veiller à la propreté des animaux comme des boxes de repos.
- Éliminer les maladies cutanées dues aux ectoparasites comme les gales, poux ou mallophages.
- Lutter contre les mouches.
- Éviter une hygrométrie élevée.

Les dartres se développent souvent en premier sur la tête, d'où elles se propagent sur tout le corps.

Photo: Rimensberger

Tableau: **Produits autorisés contre les dartres**

Produit	Substance active	Forme
Bétadine	Iode	Onguent désinfectant pour les plaies Savon liquide Solution standardisée
Dermatural	Diméthylsulfoxyde	Onguent
Neodermovet	Chlorhexidine	Onguent
Vetisept	Polyvinyl-pyrrolidioniod	Savon liquide Solution 10 % Spray
Imaverol	Enilconazole	Concentré d'émulsion
Mycorylen	Triéthanolamine	Solution
Mycophyt	Natamycine	Poudre
Bovilis Ringvag	Trichophyton verrucosum	Vaccin

www.tierarzneimittel.ch

Suite de la page 54

- Si nécessaire, réduire la densité d'occupation.
- Désinfecter rapidement les blessures.
- Bien examiner les animaux achetés.
- Veiller à un apport suffisant en oligo-éléments et en vitamines (A).
- Si possible, isoler les animaux atteints.
- Utiliser une solution de lavage ou une pommade. La vaccination donne moins de travail mais est plus onéreuse.
- Ne pas employer le même matériel de nettoyage pour les animaux malades et pour les animaux «propres», ou sinon bien le nettoyer et le désinfecter.
- Un apport de vitamine A ou de β -carotène peuvent favoriser la guérison des zones lésées par les dartres.
- Porter des gants lorsque l'on s'occupe des animaux atteints de dartres. Ensuite se laver con-

sciencieusement la tête et le cou au savon.

- Bien nettoyer – prélever, ramollir, nettoyer sous pression – et désinfecter: 0,4 l de solution désinfectant par m² de surface d'étable.

Vaccin et médicaments Le vaccin préventif «Bovilis Ringvag» a donné de bons résultats dans la pratique. Après une double vaccination, une immunité se met en place contre les dartres en l'espace de 3 à 4 semaines, aussi bien chez les animaux cliniquement sains que chez ceux qui présentent des symptômes. Elle tient 4 à 6 ans, quelquefois la vie durant. On recommande de vacciner tous les animaux du troupeau, ainsi que les nouveau-nés et les animaux achetés. On peut également inclure au programme de vaccination les animaux infectés, ce qui permet d'accélérer la guérison et de réduire la libération de spores. Pour les animaux fortement atteints, il faut prévoir des soins locaux. Les traitements de lavage ou d'aspersion se font sur ordonnance vétérinaire (tableau). ■

UFA SA propose des minéraux complémentés en vitamine A et β -carotène. Un approvisionnement équilibré en vitamines et en minéraux renforce le système immunitaire des animaux et prévient l'apparition des dartres. Parlez-en à votre conseiller en alimentation. www.ufa.ch

Halag Chemie AG propose de désinfectants appropriés qui permettent de détruire les éventuelles spores de champignons restantes après le nettoyage soigneux de l'étable. www.halagchemie.ch

INFOBOX

www.ufarevue.ch

1 · 08

machinesagricoles.ch

Votre recherche un pont arrière?

Lancez votre demande de recherche (gratuite pour vous) dans la rubrique «Recherche directe».

S'il n'y a pas encore la machine désirée, vous serez informé par un e-mail aussitôt qu'elle sera disponible.

www.machinesagricoles.ch
compte déjà plus de
2100 occasions!



Bourse aux bonnes affaires

Suite de la page 35

IHC 383-423; Steyr 540-545; Schilter UT 5001 Ø 041 910 28 45

Traktoren Porsche, alle Modelle, auch defekte Ø 062 299 14 30

Gülletransportfass, 12m³-16m³, ein- oder mehrschsig, günstig Ø 071 633 27 60 oder 079 319 29 37

Schneepflug passend an Rapid-Motormäher; Schneefräse mit Motor, kann auch defekt sein Ø 079 622 45 82

Milchtank, stationär, ca. 1800 – 2500 l, mit Kühlung, kompl. Ø 041 675 26 91 / 079 509 54 77

Kartoffelhackgerät, 2-reihig Ø 062 756 24 69

Produits fourragers

Vaste assortiment dans votre LANDI.

www.fourrages.ch
Infoline 0800 808 850