

نظريّة تكتونيّة الصفائح







Alfred Wegener

مقدمة : في سنة 1910 أدى العالم الألماني Alfred Wegener بنظرية "زححة القارات" مفاد هذه النظرية هو أن القارات كانت ملتحمة على شكل قارة واحدة تسمى la *pongée* ثم تفرقت عبر الزمن الجيولوجي إنها نظرية زححة القارات . la *dérive des continents* .
تساؤلات : - ما هي الدراسات والبراهين التي تدعم نظرية زححة القارات ؟
- كيف تنظم الصفائح على سطح الأرض ؟
- ما هي الطاقة المسؤولة عن حرکة الصفائح ؟

1- البرهنة على زححة القارات

1- أهم البراهين المرتبطة بنظرية زححة القارات .

أ- البرهان المورفولوجي (الخرائطي) . الوثيقة 1 ص 12



يتطابق الشكل الهندسي للساحل الغربي لإفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية . يدل هذا على أن هاتين القارتين كانتا تشكلن كتلة واحدة .

ب- البرهان الصخري . الوثيقة 2 ص 12

لاحظ العالم الألماني Wegener بعد تقارب الخريطتين الجيولوجيتيں لإفريقيا و أمريكا الجنوبية أن الصخور القديمة التي يتجاوز عمرها ملياري سنة تتطابق من قارة لأخرى .

ت- البرهان المستحاثي . الوثيقة 3 ص 12 .

تشابه وتماثل المستحاثات الحقب الأول التي تم العثور عليها في القارتين (إفريقيا وأمريكا الجنوبية) . مثال : الميزوزور زاحفة صغيرة تنتهي إلى الحقب الأول

- *glossopteris* مستحاثة نبات السرخس تنتهي للحقب الأول .

استنتاج :

اعتمادا على الأدلة الخرائطية والصخرية والمستحاثية توصل العالم Wegener إلى صياغة نظرية زححة القارات التي تنص على أن كل القارات الحالية كانت فيما قبل ملتحمة على شكل كتلة واحدة تسمى : اليابسة الوحيدة la *pongée* والتي تجزأت بعد ذلك إلى خمس قارات .

2- الدراسات التي تدعم نظرية زححة القارات .

أدى التقدم السريع للتقنيات المعتمدة في استكشاف المحيطات ابتداء من سنة 1950 إلى التعرف على طبوغرافية قعر المحيطات وتحديد عمر وطبيعة الصخور التي يتشكل منها .

- رسم تخطيطي يمثل طبوغرافية قعر المحيط الأطلسي (انظر الرسم)

- استنتاج تضاريس المحيط .


يتشكل قعر المحيط الأطلسي من :

- الهضبة القارية التي تمدد القارة على شكل انحدار ضعيف نسبيا إلى عمق 200 m تقريبا .

- الحافة القارية حيث يزداد العمق بسرعة حتى

4000m

- السهل البحري : منطقة واسعة مسطحة عمقها 5000m تقريبا .




- **الذروة المحيطية :** la dorsale océanique سلسلة جبلية بركانية تخترق معظم المحيطات يتواصطها خندق يسمى الخسف le rift تتميز الذروة بنشاطات بركانية وكتونية مهمة .

تمرين مدمج: اعتمادا على الوثيقان 5و4 ص 13 :

- ما هي الصخرة التي تكون قعر المحيط الأطلسي ؟
- قارن بين طبوغرافية قعر المحيط الأطلسي وعمر البازلت من جهتي الذروة .
- اقترح تفسيرا لتشكل واتساع قعر المحيط الأطلسي .

الحل :

- الصخرة التي تكون قعر المحيط هي البازلت .
- تبين الوثيقان 5و4 تماثل طبوغرافية قعر المحيط الأطلسي وعمر صخور البازلت التي يتشكل منها من جهتي الذروة ويذل هذا التماثل على أن تتشكل صخور البازلت يتم باستمرار على مستوى الذروة . ويؤدي التجدد المستمر لصخور البازلت على مستوى الذروة إلى اتساع قعر المحيط الأطلسي وتبعاد القارتين (الإفريقية والأمريكية الجنوبية) .



ر - ت بين أن قعر المحيط الأطلسي يكون من البازلت وأن عمر البازلت يزداد كلما ابتعدنا عن الذروة المحيطية في اتجاه القارتين

استنتاج : لقد مكنت الدراسات المنجزة ابتداء من 1950 من تدعيم نظرية زحزحة القارات . من بين النتائج التي تم التوصل إليها وجود تماثل لعمر البازلت الذي يتشكل منه قعر المحيط الأطلسي من جهتي الذروة وأن عمر هذه الصخور يزداد كلما ابتعدنا من الذروة . تدل هذه المعطيات على أن تتشكل وتتجدد قعر المحيط يتم على مستوى الذروة ثم يتبع من جهتي الذروة وهكذا يتسع المحيط الأطلسي وتتباعد القارتين الإفريقية والأمريكية .


2- مفهوم الصفيحة الصخرية

1- تعريف الصفيحة الصخرية .

- **الصفحة الصخرية :** la plaque lithosphérique هي قطعة صلبة وهادئة نسبيا من سطح الأرض تحدها مناطق ضيقة تعرف نشاطاً زلزاليّاً وبركانياً .

2- حدود الصفائح الصخرية .

*** نشاط .**



ر - ت بين مختلف الصفائح المكونة لسطح الكرة الأرضية

1 - اعتمادا على الوثيقة 1 ص 14 صف توزيع البراكين والزلزال في العالم .


2 - حدد عدد الصفائح التي يتتشكل منها سطح الكره الأرض و أعط اسم صفيحة محيطية واسم صفيحة محيطية قارية . (الوثيقة 2 ص 14)

*** الحصيلة المعرفية .**

1- تنتشر الزلزال والبراكين على شكل أحزمة تخترق وسط المحيطات كما تنتشر على طول حافات بعض القارات وتحد مساحات هادئة نسبيا .

- عدد الصفائح التي يتشكل منها سطح الأرض 12 صفيحة .
- اسم صفيحة محيطية: صفيحة نازكا - صفيحة الهدى ..
- اسم صفيحة محيطية قارية : صفيحة أمريكا الجنوبية - صفيحة إفريقيا ...
- * ملحوظة :** عدد صفائح الغلاف الصخري 12 صفيحة . وهذا التقسيم للغلاف الصخري لا يتطابق مع القارات و المحيطات الجغرافية ، حيث أن بعض الصفائح محيطية فقط وبعضها قارية ومحيطية في نفس الوقت .

- تقنيات حديثة لقياس حرکة الصفائح



تصدر الأقمار الاصطناعية GPS موجات راديو Ondes radio في زمن معين و تنشر هذه الأخيرة بسرعة معروفة . يسج حساب زمن وصول الموجات لنقطة التقاطها من معرفة المسافرين d_1 و d_2 الموجتين مثلاً بين القمر الاصطناعي و بقتي (Westford) (الولايات المتحدة الأمريكية) و (Wettzel) و من تم تحديد المسافة d_3 بين نقطتين تكى القواعد المثلثة من دراسة تطور المسافة بين نقطتين على سطح الأرض .

الأنوار الاصطناعية GPS نظام دائم لتحديد يشكل دقيق موقع نقطة معينة على سطح الأرض .

2- تقنيات حديثة لقياس حرکة الصفائح

- نشاط : الوثيقان 493 ص 15 .
- اعتماداً على الوثيقة 3 بواسطة ماذا تقادس حرکة الصفائح وعلى ماذا تعتمد هذه التقنية؟
- حدد اسم الصفائح التي تتنمي إليها كل واحدة من المدن الممثلة في الوثيقة 4 .
- من بين هذه الصفائح حدد الصفائح التي بينها حركة تقارب والصفائح التي بينها حركة تباعد .

* الحصيلة المعرفية .

تقاس حرکة الصفائح الصخرية عن طريق الأقمار الاصطناعية خاصة GPS والتي تصدر موجات راديو . فإذا علمنا سرعة هذه الموجات وكذلك الزمن الذي تستغرقه للوصول إلى نقطة معينة على سطح الأرض . يمكن حساب المسافة الفاصلة بين القمر الاصطناعي وهذه النقطة باتباع الطريقة التالية : $v=d/t =$ سرعة الموجات و t الوقت التي تستغرقه إذن $d = v \cdot t$. إذن $d_1 = v \cdot t_1$; $d_2 = v \cdot t_2$. وإذا علمنا أن لدينا مثلث قائم الزاوية فإن $d_2^2 = d_1^2 + d_3^2$. إذن $d_3^2 = d_2^2 - d_1^2$.

* المدن - Paris - Wettzel - Kashima تتنمي إلى الصفيحة الأوروآسيوية .

* المدن Westford - Fairbanks تتنمي إلى صفيحة أمريكا الشمالية .

* المدن Kauai - KWAJALEIN تتنمي إلى صفيحة المحيط الهدى .

* بين الصفيحة الأوروآسيوية و صفيحة أمريكا الشمالية هناك حركة تباعد بـ 1.1 سنتيمتر في السنة .

* بين الصفيحة الأوروآسيوية و صفيحة المحيط الهدى هناك حركة تقارب بـ 8.5 سنتيمتر في السنة .

* بين صفيحة المحيط الهدى و صفيحة أمريكا الشمالية هناك حركة تقارب بـ 3.9 سنتيمتر في السنة .

خلاصة : تتوزع الزلزال والبراكين النشطة على سطح الأرض على شكل أحزمة تحد مناطق صلبة وهادئة تسمى الصفائح الصخرية تتحرك هذه الأخيرة بالنسبة لبعضها البعض حسب سرعة محدودة . وينتج عن هذه الحركة إما تباعد الصفيحتين المجاورتين (مثل الصفيحة الإفريقية وصفيحة أمريكا الجنوبية) أو تقاربهما (مثل صفيحة أمريكا الجنوبية وصفيحة نازكا) .

3- مصدر الطاقة المسؤولة عن حرکة الصفائح

تمهيد : يتكون سطح الكره الأرضية من صفائح صخرية تتحرك بالنسبة لبعضها البعض . ولحدوث هذه الحركة لبد من الطاقة .

- ما هو مصدر الطاقة المسؤولة عن حرکة الصفائح ؟



- ك- يبين تطور المسافة بين مدن متواجدة ب مختلف القارات

١- تطور درجة الحرارة الأرضية ومصدرها .

نشاط :

- 1 - اعتماداً على الوثيقة 1 ص 16 أملأ الجدول أسفله .
 - 2- بين كيف تتطور درجة حرارة الأرض حسب العمق .

الحصيلة المعرفية :

3700	2000	1000	km	العمق ب
4000	2000	1500	°c	درجة الحرارة ب

1 - انظر الجدول

٢- ترتفع درجة حرارة الأرض حسب العمق . ويسمى تغير درجة حرارة الأرض حسب العمق بالدرجة السعيرية : le gradient géothermique

نشاط :

كمية الحرارة المنتجة بالمليار (joules) في الثانية	كمية الألانيوم بالمليار طن	الحجم بالمليار km^3	أغلفة كره الأرضية
9000	9300	بين 4.5 و 4	القشرة الأرضية
30000	27600	920	الرداع

وحدة قياس الحرارة : 1joule

القشرة الأرضية : هو الغلاف العلوي للكرة الأرضية ، يتراوح سماكته بين 4.5km على مستوى المحيطات (القشرة المحيطية) و 70km على مستوى القارات (القشرة القرية).

- الرداء : غلاف أرضي يوجد تحت القشرة حتى عمق km 2900

أ - قارن كمية الحرارة المنتجة على مستوى كل من القشرة الأرضية والرداء .

ب- اعتماداً على الوثيقة 3 ص 16 فسر ارتفاع درجة حرارة الأرض حسب العمق .

الحصيلة المعرفية :

أ - كمية الحرارة المنتجة على مستوى الرداء أكبر بثلاث مرات من الحرارة المنتج على مستوى القشرة الأرضية .

ب - ارتفاع درجة حرارة الأرض حسب العمق ناتجة عن تفتق عناصر إشعاعية النشاط مثل الاورانيوم والتوريوم ، التي توجد في المعادن التي تتشكل منها بعض الصخور وتميز هذه العناصر بعدم استقرارها حيث تفتق مع مرور الزمن لتعطي عناصر أخرى أكثر استقرارا وبصاحب هذا التفتق تحرير الحرارة


- وهذه العناصر إشعاعية النشاط توجد بكثرة في الرداء أكثر من القشرة الأرضية وهذا ما يفسر ارتفاع درجة حرارة الرداء أكثر من القشرة الأرضية .

2- العلاقة بين تدفق حرارة الأرض، وحرارة الصفائح.


فرضية: لتفسير مصدر الحركة النسبية للصياغ
الصخرية يفترض الجيولوجيون وجود تيارات حمل
حراري بطينة داخل الرداء وهي عبارة عن تنقل الماء
في الحالة الصلبة . محرك هذه التيارات ، الحرارة
الصادرة عن تفتت العناصر الإشعاعية النشاط .

- مناولة (أنظر الرسم).

تفسیر



٢- تعمود أحصار العمل الحراري في الرداء



هذه المناولة تقرّنا من معرفة العلاقة بين تدفق الحرارة وحالة الصفائح

حيث هنا تمثل القطعتان من الإسفلج بمثابة صفيحتين متجاورتين وان تيارات الحمل الحراري هي المسؤولة عن حركية هاتين القطعتين . إلا أن هذه المناولة لا تعكس الظروف الطبيعية في العمق سواء من حيث طبيعة وسرعة تيارات الحمل الحراري أو سرعة حركية الصفائح (بعض سنتمرات في السنة) أو من حيث طبيعة التيارات والمساحة التي تتم على مستواها .

خلاصة .

- ترتفع درجة حرارة الصخور المكونة للكرة الأرضية حسب العمق . تنتج هذه الحرارة عن تفتت العناصر الإشعاعية النشاط التي تدخل في تركيب الصخور . يؤدي تدفق حرارة الأرض الى حدوث حركات للمادة في الحالة الصلبة داخل الرداء على شكل تيارات تسمى تيارات الحمل الحراري وهي المسؤولة عن حركية الصفائح .


<http://svtimamalidemnate.ek.la/>




ر - تبيين تشابه وسائل مستحدثات الحقب الاول في افريقيا وأمريكا الجنوبيه

ر- تبيين تواجد الصخور القديمة والنادرة
تسبيباً في العالم في إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة


ر- ت بين تطابق الشكل الهندسي للساحل الغربي لإفريقيا والساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية



ر- ت بين طبغرافية قعر المحيط الأطلسي



ر - تبيّن أن قعر المحيط الأطلسي يتكون من البازلت وأن عمر البازلت يزداد كلما ابتعدنا عن القروة المحيطية في اتجاه القارتين



ر- ت بين مختلف الصفات المكونة لسطح الكرة الأرضية

