



Signes moins graves



Urticaire, peau rouge, qui gratte, eczéma




Mal au ventre, envie de vomir, diarrhée




Lèvres qui enflent, goût et sensation bizarres, nez bouché, qui coule, qui gratte, éternuements, yeux rouges, gonflés, qui piquent, pleurent

Signes graves



Gorge serrée, qui gratte, gêne pour respirer



Toux rauque, incessante, sifflements




Vomissements répétés







Difficulté à parler



Malaise, tout mou



PREVIENS UN ADULTE ET VA CHERCHER TA TROUSSE D'URGENCE (TU DOIS TOUJOURS L'AVOIR AVEC TOI)

<p>AGGRAVATION DES SIGNES Malaise, étouffement, Perte de connaissance</p>	<p>Enlever le bouchon noir Protecteur de l'aiguille</p>	<p>Poser le stylo-injecteur Sur le côté de la cuisse <small>pas</small> Tirer le capuchon noir Sécurité du bouton rouge</p>	<p>Appuyer sur le bouton rouge Maintenir 10 secondes</p>	<p>ANAPEN = SURVEILLANCE MEDICALE</p>
<p>ANAPEN Contacter obligatoirement le 15</p> 	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> <p>Secours Urgence</p> <p>15</p>



Fais attention en manipulant l'ANAPEN de ne pas te piquer le doigt ou la main

Tu dois t'entraîner tous les ans avec un ANAPEN Trainer, tout comme ta famille !