

* وصفة عصارة الحريقة :

في فصل الربيع ، بعد نمو نباتات الحريقة وقبل الإزهار يتم جني 1 كيلوغرام من الأوراق الطرية ثم تطحن وتوضع في 10 لترات من ماء المطر مدّة 8 أيام .

بعد حصول عملية التخمر يرشح المنقوع بواسطة قطعة قماش فنحصل على عصارة الحريقة التي تعبأ في قوارير وتخزن في مكان رطب للاستعمال عند الحاجة .

إنّ هذه العصارة مرتفعة التركيز تستعمل بعد التخفيف بنسبة 5 % ، فترش على المزروعات كل 10 أو 15 يوم طيلة مرحلة النمو مما يجعل المزروعات لامعة ونظرة و محمية من الأمراض والحشرات الضارة مثل الأرقعة . يمكن استعمال هذه العصارة بعد تخفيفها بنسبة 20 % تسقى بها المزروعات مرّة كل 10 أو 15 يوم فتصبح سمادا جيدا يخصب التربة ما يحسّن في الإنتاج النباتي (منتوج طبيعي وغير مكلف) .

عصارة
الحريقةنبات
الحريقة

3 - ماهو تعريف الفلاحة البيولوجية ؟

• استنادا إلى ما توصلت إليه في الأنشطة السابقة عرّف الفلاحة البيولوجية وحدّد أهدافها.

الخلاصة

1 - الفلاحة العصريّة لاتضمن حفظ الصحّة ولا تحافظ على المحيط :

- الاستعمال المكثف للمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية المصنّعة تضربتركيب التربة وذلك بالقضاء على عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة والنباتية والحيوانية .
- الري المتكرّر يسبب زيادة ملوحة التربة ويساهم في تلوث المياه الجوفية بواسطة النترات .
- إنّ هذه الممارسات لا تضمن جودة الإنتاجية على المدى البعيد وتخلّ بالتوازن البيئي وتعطي منتوجا يفتقر أحيانا للمواصفات لأنّه ملوث بالمبيدات .

2 - الفلاحة البيولوجية تضمن حفظ الصحّة وتحافظ على التوازن البيئي :

- تشجّع الفلاحة البيولوجية على اعتماد الطرق التقليدية الطبيعية :
- * تخصيب التربة بأسمدة طبيعية .
- * اعتماد المقاومة البيولوجية ضد الطفيليات المتسببة في الأمراض التي تصيب النباتات .
- * اعتماد مبدأ التداول الزراعي .
- إنّ هذه الطرق تمكّن من الحصول على منتوجات ذات جودة عالية محافظة على نكهتها الطبيعية وغنيّة بالأحماض والفيتامينات والمواد العضوية .
- تمكّن الفلاحة البيولوجية من استغلال المنظومات البيئية بطريقة عقلانية وسليمة مما يضمن التنمية المستدامة .


3 - الفلاحة البيولوجية : تعريفها وأهدافها

أ- تعريف الفلاحة البيولوجية

الفلاحة البيولوجية هي طريقة إنتاج فلاحي دون استعمال أسمدة معدنية ولا مبيدات ودون تدخل لتغيير النمو الطبيعي للنباتات والحيوانات .

ب- أهداف الفلاحة البيولوجية

- إنتاج أغذية ذات جودة عالية لاتضرّ بصحة الإنسان .
- حسن استغلال الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة .
- المحافظة على التوازن الطبيعي للمنظومات البيئية وإعطاء أهمية للتنوع الحيواني و التنوع النباتي .



تمرين عدد 1:

الهدف : اختبار القدرة على التطبيق

لتربية الحيوانات في نطاق الفلاحة البيولوجية [الأغنام (الوثيقة 16) . الأرانب. الماعز. الأبقار، الدجاج ...]

يمكن استثمار المعطيات التالية :

1 - اختيار الحيوانات الملائمة للتربية البيولوجية :

- اختيار حيوانات متأتية من التربية البيولوجية
- حيوانات سابقة متكيفة مع ظروف الوسط البيئي المحلي .
- توفير ظروف تكاثر طبيعية وتجنب الإخصاب الاصطناعي.
- عدم تربية حيوانات معدلة وراثيا.*

2 - عدم تدجين الحيوانات :

الوثيقة 16 : قطع من
الغنم في المرعى

- عدم تقييد الحيوانات ولا تدجينها في أماكن ضيقة وإتباعها
- تركها ترعى في الهواء الطلق وعلى مساحات واسعة .

• عدم تخريب أو قطع بعض أعضاء الحيوانات مثل (القرون و الحوافر والأظافر و الریش ...)

3 - تقديم أغذية طبيعية للحيوانات :

- تقديم أغذية متنوعة ومتوازنة للحيوانات لضمان نموها مثل (التبن . الحبوب . الأعشاب الخضراء) : أغذية متأتية من الزراعات البيولوجية .
- عدم تقديم أغذية مصدرها بقايا جثث الحيوانات (دقيق فضلات الحيوانات) ** والامتناع عن إضافة هرمونات النمو .

4 - الوقاية من الأمراض :

- اختيار أنواع حيوانية مقاومة للأمراض .
- تقديم أغذية متوازنة .
- تطبيق قواعد حفظ الصحة مثل (النظافة ، كثافة الحيوانات...) علما وأن تلقيح الحيوانات غير منصح به إلا في الحالات الاستثنائية وعند الإصابة بالمرض يتم معالجة الحيوان المصاب فقط والأدوية المستعملة مصدرها مواد نباتية طبيعية .

بين بالاعتماد على المعطيات السابقة كيف نطبق التربية البيولوجية على الحيوانات لتحقيق التنمية المستدامة وذلك :

- بالمحافظة على صحة الحيوانات والإنسان .
- بتطوير الزراعة البيولوجية .

* طريقة حديثة معتمدة بكثرة في بعض البلدان المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الطريقة تعتمد تغيير الخصائص الوراثية وانتقاء الصفات المحبذة والضامنة لإنتاجية عالية .
** هو المسبب الرئيسي لمرض جنون البقر .

تمرين عدد 2 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة

1 – اعتمادا على الجدول التالي قارن مردودية كل من الفلاحة العصرية والفلاحة البيولوجية بالنسبة للمنتوجات المقترحة.

مردودية الفلاحة البيولوجية طن/الهكتار	مردودية الفلاحة العصرية طن/الهكتار	المنتوجات
34	55	بطاطا
5.1	7.9	قمح
29	51	بصل

جدول يبرز المردود الزراعي للفلاحة العصرية والفلاحة البيولوجية لبعض الزراعات في حقل

2 – فسّر فوائد الفلاحة البيولوجية .

الإصلاح

تمرين عدد 2 :

المنتوجات	مردودية الفلاحة العصرية طن/الهكتار	مردودية الفلاحة البيولوجية طن/الهكتار	الفارق في المردود طن/الهكتار
بطاطا	55	34	21
قمح	7.9	5.1	2.8
بصل	51	29	22

تبين مقارنة مردودية كل من الفلاحة العصرية والفلاحة البيولوجية بالنسبة للمنتوجات المقترحة أن مردودية الفلاحة البيولوجية أقل من مردودية الفلاحة العصرية من ناحية الكمية ومنتجاتها صحية للإنسان بينما منتجات الفلاحة العصرية يمكن أن تسبب في أمراض مكلفة في علاجها إضافة إلى كلفة إزالة آثار التلوث في المحيط.

2 – فوائد الفلاحة البيولوجية هي :

الفلاحة البيولوجية هي طريقة إنتاج فلاحي تعتمد استعمال المواد العضوية الطبيعية ولا تتدخل لتغيير النمو الطبيعي للنباتات كما أنها تعمل على إنتاج أغذية ذات جودة عالية محافظة على نكهتها الطبيعية وغنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات والمواد العضوية فلا تضر بصحة الإنسان وتمكن من حسن استغلال الموارد الطبيعية لضمان التنمية المستدامة كما أنها تحافظ على التوازن الطبيعي للمنظومات البيئية .

تمرين عدد 3 :

الهدف : اختبار القدرة على التطبيق

- تشجع الفلاحة البيولوجية على إدخال الإنتاج الحيواني مع الإنتاج النباتي بشرط تحديد عدد الحيوانات المربيّة مثال بقرتين في الهكتار الواحد .
- 1 - فسّر أهمية تداخل الإنتاج الحيواني مع الإنتاج النباتي .
 - 2 - بيّن أسباب تحديد عدد الحيوانات المرباة في مزارع الفلاحة البيولوجية .

تمرين عدد 4 :

الهدف : اختبار القدرة على التحليل

- يمثل الجدول التالي معطيات تتعلّق بالإصابة بمرض الميلديو ومردويّة البطاطا في ظروف مختلفة . (المعهد العالي للفلاحة والبستنة بشط مرم)


زراعة البطاطا		النسبة المئوية للمادة العضوية الطبيعية المستعملة (%)	
المردود طن/هكتار	نسبة الإصابة بالمرض (%)	مكونات المادة العضوية	النوع
14.7	18.7	100% روث الأبقار	1
1.77	18.1	80% روث الأبقار 20% روث الأغنام	2
1.53	14.7	70% روث الأبقار 20% روث الأغنام 10% فضلات الطيور	3
2.16	8.9	50% روث الأبقار 20% روث الأغنام 20% فضلات الطيور 10% تبن قمح مرحي	4
2.24	5.8	المعالجة بحلول النحاس بدون مادة عضوية طبيعية .	
1.5	35.3	زراعة شاهدة غير معالجة	

- 1 - حلّل المعطيات السابقة .
- 2 - ماذا تستنتج ؟

التجربة الحقلية لتنمية الفلاحة البيولوجية في تونس :



الوثيقة 18 : حوار مع
الفلاحين لتنمية التجربة
الحقلية في الفلاحة البيولوجية



الوثيقة 17 : دراسة ميدانية
لحقول الفلاحة البيولوجية
بالبلاد التونسية

1 - ماهي التجربة الحقلية ؟

التجربة الحقلية هي طريقة بحث وتكوين تعتمد على معرفة الوسط البيئي لاستغلاله في الميدان الفلاحي و تمكن الفلاحين من تجاوز العوائق والمشاكل الزراعية وتضمن لهم منتوجا صحيا يلقي رواجاً على المستوى الوطني والعالمي .
انطلقت التجربة الحقلية في الفلاحة البيولوجية في شهر أكتوبر 2003 بالتعاون مع عدّة أطراف متخصصة في الميدان الفلاحي مثل الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي و وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و المركز الفني للفلاحة البيولوجية ...

2 - دراسة التحديات والحلول في التجربة الحقلية البيولوجية :

أ - الزياتين :

تتميز شجرة الزيتون بتكيفها للظروف المناخية وعوامل التربة خاصة الأمطار ولها قابلية الاستعمال في الفلاحة البيولوجية .



الوثيقة 20 : مواد غذائية مختلفة
منتجة بواسطة الفلاحة البيولوجية



الوثيقة 19 : دراسة ميدانية
لحقل زيتون

العوائق	الحلول
<ul style="list-style-type: none"> • اختلال الإنتاج بسبب العوامل المناخية خاصة الأمطار. 	<ul style="list-style-type: none"> - إضافة المادة العضوية الطبيعية في التربة لزيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء . - مضاعفة الجهد في عمل التربة بهدف التقليل من تبخر الماء .
<ul style="list-style-type: none"> • تأثير الحشرات الضارة . 	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد المقاومة البيولوجية .
<ul style="list-style-type: none"> • ممارسة الزراعة الأحادية (الزيتين) . 	<ul style="list-style-type: none"> - تنوع الزراعات بين أشجار الزيتون كزراعة الأشجار المثمرة مثل (الفستق ، اللوز...) أو نباتات عطرية وطبية لها القدرة على التكيف مع نفس الظروف المناخية للزيتون .

ب- النخيل :

في الواحات تمارس زراعة النخيل بصفة عادية باستعمال ضعيف للمواد الكيميائية المصنّعة كما أنّ شجرة النخيل تتكيف جيّداً مع الظروف المناخية وعوامل التربة فهي أقل عرضة للآفات وللأمراض الزراعية .



الوثيقة 22 : دقلة النور



الوثيقة 21 : واحة نخيل

العوائق	الحلول
<ul style="list-style-type: none"> • آفة الحشرات الضارة (تقرض النباتات) والتي تصيب التمور وخاصة دقلة النور . 	<ul style="list-style-type: none"> • تغطية العراجين بقماش شبكي رقيق .
<ul style="list-style-type: none"> • آفة القراديات . 	<ul style="list-style-type: none"> • المعالجة بمادة الكبريت المسموح بها في الفلاحة البيولوجية .
<ul style="list-style-type: none"> - صيانة أشجار النخيل . 	<ul style="list-style-type: none"> • تنظيف النخيل من بقايا الشّذب .
<ul style="list-style-type: none"> • الزراعة الأحادية . 	<ul style="list-style-type: none"> • زراعة مستويات نباتية بين أشجار النخيل مثل الأشجار المثمرة و الخضروات ... وكذلك زراعات الأسمدة الخضراء مثل الفصّة والحريّة .

ج- الزراعات الكبرى:

للحصول على محاصيل جيّدة في الزراعات الكبرى التي تخص الحبوب يتمّ تحسين خصوبة التربة وذلك بإضافة المواد العضوية الطبيعية واعتماد مداولة متوازنة ومتنوعة للزراعات بما يمكن من المقاومة الوقائية ضد الآفات الزراعية .



الوثيقة 25 : أنواع مختلفة من الخبز



الوثيقة 23 : حقل حبوب



الوثيقة 24 : بذور القمح

الحلول	العوائق
• المداولة الزراعية مع البقوليات	• الزراعة الأحادية.
• استعمال أسمدة عضوية طبيعية.	• تخصيب التربة بالمواد الكيميائية

د - الخضر والغلال :

يتطلب تحسين إنتاج الخضروات والغلال باعتماد الفلاحة البيولوجية مراقبة متواصلة بخصوص الأمراض لمقاومتها وتخصيبا هاما جدا بالمواد العضوية الطبيعية واختيار الزراعات المتكيفة مع الظروف البيئية المحلية وذلك باعتماد الأنواع الملائمة كما يجب زراعة حواجز طبيعية لدعم الوقاية البيولوجية واعتماد التقنيات الزراعية للحصول على مردود جيّد .




الوثيقة 27 : شجرة تفاح مثمرة



الوثيقة 26: زراعة الخضر



الوثيقة 29 : جني منتوج العنب



الوثيقة 28 : استخراج البطاطا من التربة

الحلول	العوائق
• تنوع المداولة الزراعية .	• انخفاض ملحوظ للمردود .
• المقاومة البيولوجية.	• تأثير الأمراض .
• إضافة السماد العضوي الطبيعي .	• عدم توفر السماد العضوي الطبيعي

الفلاحة البيولوجية: تناغم المواطن مع محيطه

بظهور جنون البقر إضافة إلى تلوث المحيطات والبحار بالنفط وصولاً إلى أنفلونزا الطيور. تتمكك الإنسان الهواجس حول الأغذية التي يجب تناولها. فإذا كانت هذه الكوارث التي لحقت باللحوم كبيرة كيف نحسن الإنتاج الزراعي الوطني أمام تطور التعديل الوراثي للمنتوجات حتى صرنا نخشى أن تنقلب أشكال الخضر والغلل وأوانها وطعمها .

وطبيعي أن نعود إلى البحث عن أمان ويقين العادات الطبيعية والتقاليد الغذائية التي أثبتت الزمان فعاليتها أمام أمراض العصر. فقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مفهوم الفلاحة البيولوجية. وبما أن كلمة "بيو" باللاتينية تعني الحياة. فقد استبشر البعض وأملوا خيراً في اقتران هذا المفهوم وهذا اللفظ بنوعية الزراعة في بلادنا. وانبثقت تساؤلات بسيطة حول ماهية هذه الفلاحة البيولوجية ومدى انتشارها وآفاقها المستقبلية على صحة المواطن التونسي.

تعتبر الفلاحة البيولوجية هي طريقة إنتاج تدعم التوازن الطبيعي للمنظومة البيئية وتحافظ على التنمية المستدامة تهدف إلى الحصول على إنتاج متنوع وصحي وذو جودة عالية وبالتالي المحافظة على صحة الإنسان والنهوض بالتصدير.

ويحجر في الفلاحة البيولوجية استعمال كل المواد الكيميائية المصنعة من أسمدة ومبيدات وكل التدخلات التي تغير النمو الطبيعي للنبات أو الحيوان. وهي تخوي على التقنيات التالية :

- العناية بالتربة والمحافظة على خصوبتها وأنشطتها البيولوجية من خلال إعادة رسكلة المواد العضوية خاصة وخدمة الأرض والتداول الزراعي وإضافة المواد المعدنية الطبيعية عند الحاجة.
- الوقاية ثم الحماية لمقاومة الآفات والأمراض عند النبات والحيوان وذلك بإتباع طرق زراعية وبيولوجية تهدف إلى تقوية وسائل الدفاع الطبيعي والمحافظة على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

والجدير بالذكر أن هذه الفلاحة التي تلقى اهتماماً وتطوراً كبيراً في السنين الأخيرة من خلال إستراتيجية وطنية يعود الفضل في تعاطيها إلى الفلاحين الذين ثابروا منذ الثمانينات وراهنوا على تطورها.

ولقد تطورت الفلاحة البيولوجية من 300 هكتار سنة 1997 إلى مائة ألف هكتار زراعات و 58 ألف هكتار مراعي و غابات سنة 2004. ومن أجل هذا وقع إقرار عدة إجراءات في السنوات الأخيرة للعناية بقطاع الفلاحة البيولوجية من ذلك :

- إعداد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون وخاصة إحداث اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية وشروط الإنتاج حسب الطريقة البيولوجية.

- بعث جامعة وطنية للفلاحة البيولوجية في صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
 - سن التشجيعات لهذا القطاع من ذلك إسناد منحة بـ30% من قيمة التجهيزات والآلات والوسائل الضرورية للفلاحة البيولوجية.
 - إسناد منحة بـ70% من تكاليف المراقبة على الإنتاج البيولوجي لمدة خمس سنوات.
 - إسناد جائزة رئاسية لأحسن منتج في الفلاحة البيولوجية.
- هذه التشجيعات إضافة إلى الظروف المناخية والتقاليد الزراعية في العديد من المناطق الملائمة لتعاطي الإنتاج البيولوجي النباتي والحيواني من شأنها أن تشكل مستقبلا واعدة للفلاحة البيولوجية في تونس لأنها فلاحة اقتصادية واجتماعية وبيئية تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها كما تمكننا من الحصول على إنتاج صحي ذي جودة عالية لا يتعارض مع تنوع الإنتاج الفلاحي والنهوض بالتصدير. كما من شأنه أن يحقق تناغما بين الإنسان والطبيعة تنسيه الانعكاسات السلبية للتطور العالمي على صحة الإنسان البدنية والنفسي.

المكافحة البيولوجية لوقاية التمور

يعتبر نخيل التمر من أهم العناصر التي تركز عليها الزراعة في واحات الجنوب التونسي. ويشكل بذلك القاعدة الأساسية لاقتصاد هذه المنطقة حيث تلعب النخلة دور العمود الفقري في تشكيل النمط الزراعي داخل الواحات.

رغم ما حققه قطاع النخيل من تطور ملحوظ خلال السنين الأخيرة إلا أن جودة التمور لم تواكب هذا التحسن بفعل تعرضها للإصابة بالعديد من الآفات الحشرية وخاصة دودة التمور وهذه الأخيرة عبارة عن فراشة صغيرة من عائلة حرشفية الأجنحة تتغذى على أنواع عديدة من الثمار كالرمان والتين و الخروب وخاصة التمور حيث تصل نسبة إصابتها إلى حدود 20% من الإنتاج الوطني.


لقد تم التمكن من اكتشاف سلالة محلية من طفيلي "التركوجرام" الذي يصيب بيض دودة التمور من خلال بعث وحدة صغيرة لإكثاره وإطلاقه داخل الواحات لدراسة نجاعته.

النتائج المسجلة تشير بوضوح إلى وجود الطفيلي بشكل طبيعي في الواحات ولكن نسبة تطفله على بيض دودة التمور لا تتجاوز 3% و في المقابل أدت عمليات الإطلاق إلى زيادة هذه النسبة لتصل إلى 78.8% وبلغت نسبة الثمار المصابة بدودة التمور حوالي 3.5% على النخيل المعامل مقابل 6.5% وهي النسبة التي سجلت على نخيل المقارنة.

لتسهيل عملية استخدام هذا الطفيلي من قبل المزارعين تم دراسة مدى قابلية انتشاره عموديا وقد أظهرت النتائج المسجلة أن لهذا الطفيلي القدرة على الوصول إلى مستوى العراجين حيث بلغت نسبة اكتشافه لبيض الفراشة 100% بغض النظر عن موقع إطلاقه على ساق النخلة التي هي في أوج إنتاجها. كما أوضحت النتائج أن نسبة التطفل ترتفع بزيادة أعداد الطفيلي المطلق وتنخفض بزيادة المسافة الفاصلة بين موقع الإطلاق ومستوى العراجين الحاملة للبيض العائل

و هكذا فإن المزارع لم يعد في حاجة لتسلق النخلة حتى يطلق الطفيلي قرب العراجين وإنما يضعها على ساق النخلة في مستوى ارتفاعه مع مراعاة الزيادة في عدد الطفيلي المطلق.

التطفل تبعاً لتركيز العدد ومستوى الإطلاق



تحسين الإنتاج الحيواني

علاوة على الإنتاج النباتي يعتبر الإنتاج الحيواني هاما في توازن الوسط (علاقات غذائية) و لتغذية الإنسان الذي يسعى لتجويد تربية الأبقار لإنتاج اللحوم الحمراء والحليب (الوثيقة 1 و الوثيقة 2) تربية الدجاج لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض (الوثيقة 3 والوثيقة 4) تربية الأسماك (الوثيقة 5) تربية النحل لإنتاج العسل (الوثيقة 6)...

كيف يتم تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على تغذية الحيوانات وعلى تكاثرها؟



الوثيقة 2 : حلب الأبقار بطريقة آلية



الوثيقة 1 : تقديم العلف الملائم للأبقار



الوثيقة 4 : دجاج منتج للبيض



الوثيقة 3 : تربية الدجاج اصطناعيا



الوثيقة 6 : تربية النحل



الوثيقة 5 : تربية أسماك التن بسواحل المهديّة

فهرس الجزء الثاني

المحور الأول - التغذية عند الحيوان

- الدرس 1 : تنوع الأنظمة الغذائية عند الحيوانات
- الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على غذائه

المحور الثاني - التكاثر عند الحيوان

- الدرس 1 : التكاثر عند الطيور
- الدرس 2 : تحسين إنتاج بعض الحيوانات بالتأثير على تكاثرها

المحور الثالث - النمو عند الحيوان

- الدرس 1 : دراسة النمو عند بعض الحيوانات
- الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على النمو

مكتسباتي السابقة :

- الحيوانات تصطاد بالمطاردة ، بالمباغلة ، بالحيلة والفتح تستهلك غذائها بطرق مختلفة (5 أساسي).
- تنوع الحيوانات الفقرية واللافقرية وتصنيفها (7 أساسي)



الوثيقة 7 : حيوانات فقرية ولافقرية داخل وسطها البيئي

بعضها يصطاد والبعض الآخر يستهلك غذائه

تتغذى الحيوانات داخل أوساطها البيئية بأغذية نباتية أو حيوانية أو نباتية وحيوانية
كيف يتدخل الإنسان لتوفير الغذاء الملائم للحيوانات لتحسين إنتاجها باعتبار أنظمتها الغذائية؟

فهرس المحور الأول

الدرس 1 : تنوع الأنظمة الغذائية عند الحيوانات

الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على غذائه

من الحيوانات ماهو عاشب كالأرنب (الوثيقة 8) والمعزاة (الوثيقة 9) وماهو لاحم كالقط (الوثيقة 10) وماهو كالخنزير (الوثيقة 11)

كيف تفسر تنوع الأنظمة الغذائية عند الحيوانات ؟



(الوثيقة 9)



(الوثيقة 8)



(الوثيقة 11)




(الوثيقة 10)

1 - استهلاك الغذاء عند الحيوانات العاشبة

النشاط الأول : الأنظمة الغذائية عند الحيوانات العاشبة


- شاهد أعضاء استهلاك الغذاء عند :
- المعزاة (الوثيقة 12 والوثيقة 13 والوثيقة 14) أو حيوانات أخرى كالبقرة (الوثيقة 15).
الكبش ...
- الأرنب (الوثيقة 16) أو حيوانات أخرى كالسنجاب ، الهمستار ...
- الحصان (الوثيقة 17) أو حيوانات أخرى كالحمار الأهلي ، الحمار الوحشي ...
- أبرز العلاقة بين النظام السنّي والنظام الغذائي عند الحيوانات المذكورة.
- استنتج تكيّف الحيوان العاشب لنظامه الغذائي .



الوثيقة 13 : أضراس معزاة

الوثيقة 12 : جمجمة معزاة
وجه جانبي

الوثيقة 15 : جمجمة بقرة وجه جانبي



الوثيقة 14 : معدة معزاة



الوثيقة 17 : جمجمة حصان



الوثيقة 16 : جمجمة أرنب

2 - استهلاك الغذاء عند الحيوانات اللاحمة

النشاط الثاني : النظام الغذائي عند الحيوانات اللاحمة


- شاهد أعضاء استهلاك الغذاء عند القط (الوثائق 18 و19 و20) وأحيوانات أخرى كالكلب (الوثيقة 21) أو الأسود (الوثيقتين 22 و23).
- أبرز العلاقة بين النظام السنّي والنظام الغذائي .
- استنتج تكيّف الحيوان اللاحم لنظامه الغذائي .



الوثيقة 19 : جمجمة قط



الوثيقة 18 : قط يتغذى



الوثيقة 21 : جمجمة كلب



الوثيقة 20 : أضراس قط



الوثيقة 23 : جمجمة أسد



الوثيقة 22 : أسد يستهلك فريسته

3 - استهلاك الغذاء عند الحيوانات الكالشة

النشاط الثالث : النظام الغذائي عند الحيوانات الكالشة

- شاهد أعضاء استهلاك الغذاء عند الخنزير (الوثيقتين 24 و25)
- أبرز العلاقة بين النظام السنّي والنظام الغذائي .
- استنتج تكيّف الحيوان لنظامه الغذائي .



الوثيقة 25 : أضراس خنزير

الوثيقة 24 : جمجمة خنزير

النشاط الرابع : مقارنة الأنظمة الغذائية عند الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة والحيوانات الكالشة

- ارسم جدولاً على كرأسك توضح فيه العلاقة بين الأنظمة السنّية والأنظمة الغذائية عند الحيوانات .
- استنتج مفهوم تكيّف أعضاء استهلاك الغذاء حسب الأنظمة الغذائية.


الحيوان	النظام السنّي	النظام الغذائي

الخلاصة

النظام الغذائي	النظام السنّي	الحيوان
عاشب مجتر	 <ul style="list-style-type: none"> • القواطع موجودة في الفك السفلي و منعدمة في الفك العلوي فيظهر نتوء متقرّن • الأنياب منعدمة • الأضراس كبيرة و قوية (لطحن العشب) وبها لوحة تأكل <p>النظام السنّي ناقص</p>	المعزاة
عاشب قارض	 <ul style="list-style-type: none"> • القواطع طويلة معقوفة حادّة ومبريّة كالأزميل لقضم العشب • الأنياب منعدمة • الأضراس صغيرة ومتشابهة ومزوّدة بنتوءات لسحق العشب <p>النظام السنّي ناقص</p>	الأرنب
عاشب	 <ul style="list-style-type: none"> • القواطع طويلة عريضة و حادّة لقطع العشب • الأنياب ضامرة • الأضراس كبيرة و قويّة لسحق العشب وطحنه ولها لوحة تأكل <p>النظام السنّي كامل</p>	الحصان
لاحم	 <ul style="list-style-type: none"> • القواطع قصيرة وصغيرة • الأنياب معقوفة خنجرية وحادّة لتمزيق اللحم • أضراس ذات حواف حادّة تعمل كالمقص لقطع اللحم <p>النظام السنّي كامل</p>	القط

النظام الغذائي	النظام السنّي	الحيوان
كالش	 <ul style="list-style-type: none"> • قواطع طويلة وحادة لتقليب التربة وقطع العشب • أنياب ضخمة معقوفة وحادة لتمزيق اللحم • أضراس قوية وساحقة النظام السنّي كامل 	الخنزير

تنوّع الأنظمة الغذائيّة عند الحيوانات منها العاشبة المجترّة (الوثيقة 26) والعاشبة القارضة واللّاحمة والكالشنة .
يبرز تكيف الحيوانات لأنظمتها الغذائيّة في التلاؤم المحكم بين الأغذية التي تتغذى بها والأعضاء المستعملة لاستهلاكها .




الوثيقة 26 : مراحل الاجترار عند البقرة

تمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة

الحصان والبقرة يلتقطان العشب من المرعى و لكل حيوان طريقته الخاصّة في التقاط العشب واستهلاكه بالاعتماد على الوثيقة 27:

- قارن كميّة التقاط العشب عند البقرة والحصان في وقت محدود .
- بيّن لماذا لا يستهلك الحصان كميّة كبيرة من العشب مقارنة مع البقرة



الوثيقة 27

تمرين عدد 2 :

الهدف : اختبار القدرة على التطبيق



تبين الوثيقة 28 جمجمة سنجاب وبنية أحد أضراسه

1 - أكتب البيانات على كرّاسك وفق الحروف على الرسم .

2 - ماهي خصائص الأسنان س (1) وس (2) و دورها في استهلاك الغذاء؟

3 - ماذا تسمّى المساحة (م) للسن (س2) المبيّنة بالوثيقة.

4- استنتج النظام السنّي والنظام الغذائي للسنجاب.

الوثيقة 28


تمرين عدد 3:

الهدف : اختبار القدرة على الفهم والتطبيق



الوثيقة 29

تلتقط البقرة الوحشية كمية كبيرة من العشب في المراعي (الوثيقة 29) وتخزنه في جيب كبير بالمعدة يسمى الكرش ثم تستلقي جانبا (الوثيقة 30) فينتقل العشب من الكرش إلى القلنسوة حيث يتحول إلى كريات تصعد إلى الفم عبر المريء تطحن البقرة الوحشية كريات العشب بالأضراس في الفكين السفلي و العلوي أنظر (الوثيقة 31) فتحرك فكها السفلي حركة أفقية واسعة تساعدها في ذلك العضلات الماضغة القوية ثم تبتلعه ليتواصل الهضم في الأنبوب الهضمي.



الوثيقة 30

1 – استنادا إلى الوثائق 30 و 31 و 32 حرر فقرة تبين فيها كيف تلتقط البقرة الوحشية العشب في المرعى ثم تسحقه بأسنانها أثناء الاجترار مع إبراز العلاقة بين النظام السنّي والنظام الغذائي

2 – إذا علمت أنّ الأوراق الميتة تتفكك بالجراثيم أبحث عن دور الجراثيم الموجودة في كرش البقرة.



الوثيقة 32




الوثيقة 31

تمرين عدد 4 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة والتطبيق

يعيش فأر الغابة في الأوراق المتراكمة والكثيفة، يتغذى في فصل الربيع على ثمار البلوط و في فصل الشتاء يتغذى بالحزازيات والنباتات الطرية مضيضا بعض الديدان والحشرات .
أما فأر الحقل يضرب بالمنتوجات الفلاحية و يتلف الزراعات ويفسدها كالبرسم والخضروات والقمح فيتغذى بالبذور الخضراء ويختزن جزء منها في مخابئه التي يحفرها في التربة مما يسبب أضرارا في جذور النباتات.



- 1 - أكتب البيانات على كراسك وفق الأرقام الموجودة على صورة جمجمة الفأر .
- 2 - استنتج الصيغة السنّية للفأر
- 3 - (أ) بالاعتماد على النص قارن الأغذية التي يعيش عليها فأر الغابة و فأر الحقل .
- (ب) قارن النظام الغذائي لفأر الغابة و فأر الحقل .
- 4 - عرّف مفهوم التكيف للنظام الغذائي.

الإصلاح

تمرين عدد 4 :

- 1 - البيانات : 1 فك علوي ، 2 فك سفلي ، 3 أضراس ، 4 قواطع
- 2 - الصيغة السنّية للفأر ناقصة لانعدام الأنياب
- 3 -

فأر الحقل	فأر الغابة	
<ul style="list-style-type: none"> • البرسم • القمح • الخضروات 	<ul style="list-style-type: none"> • ثمار البلوط • الحزازيات • النباتات الطرية • الديدان • الحشرات 	(أ) الأغذية
عاشب	كاش	(ب) النظام الغذائي

4- التكيف للنظام الغذائي هو التلاؤم الحكم بين الأغذية التي يعيش عليها الحيوان والأعضاء المستعملة لاستهلاكها.

تمرين عدد 5:

الهدف : اختبار القدرة على التحليل


الثعلب يتغذى على الدجاج فهل هو حيوان لاحم فحسب ؟
 تبرز الوثيقة (33) أسنان الثعلب والوثيقة (34) الوضع المائل للرأس أثناء استهلاك لحم الفريسة
 و تبين الوثيقة (35) النظام الغذائي للثعلب عبر الفصول .



الوثيقة 34



الوثيقة 33



الوثيقة 35


- 1 - بالاعتماد على الوثيقتين (33) و(34) صف خصائص الأسنان ودورها في استهلاك الغذاء.
- 2 - حلّل الوثيقة (35) ثمّ فسر اختلاف النظام الغذائي عند الثعلب عبر الفصول .
- 3 - استنتج النظام الغذائي للثعلب.

تلبية للحاجيات المتزايدة لاستهلاك اللحوم بسبب تطوّر عدد السكّان توّجّهت عناية العديد من الدول من بينها تونس نحو تشجيع تربية أنواع مختلفة من الحيوانات مثل الأسماك (الوثيقتان 36 و37) والدواجن (الوثيقتان 38 و39) والأرانب والأبقار ...

• كيف يمكن تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على تغذية الحيوان؟



الوثيقة 37: مشروع تربية التن
بساحل سلقطة (ولاية المهدية) بلغ
إنتاجه 650 طن



الوثيقة 36: تطوّر كتلة سمكة
السلمون من 280 غ إلى 850 غ
بفضل التغذية الملائمة



الوثيقة 38: ضيعة تربية الدواجن

2005	2004	2003	
الإنتاج (طن)	الإنتاج (طن)	الإنتاج (طن)	
39161	42958	39413	الجملة

الوثيقة 39: تطور إنتاج لحم

الدجاج في تونس

مثال : تحسين إنتاج الدواجن**1 - مقارنة الإنتاج بالطريقة التقليدية والإنتاج بالطريقة العصرية**

النشاط الأول: لماذا يعدّ إنتاج الدواجن بالطريقة التقليدية غير كاف لتلبية حاجة المستهلكين؟

• بالاعتماد على النص التالي فسّر أسباب محدودية إنتاج الدواجن بالطريقة التقليدية.

إن تغذية الدواجن بصفة تقليدية لا تتطلب مجهوداً كبيراً من المربيين فهي تبحث عن غذائها بالتجول في الطرقات وبين المنازل فنلتقط ما تعثر عليه من مخلفات المحاصيل أو بقايا الطعام ولا يتم الاهتمام كثيراً بتقديم ماء الشرب النظيف فتشرب من الماء الراكد القذر الذي ينقل إليها الأمراض . كما أن المربيين لا يبذلون جهداً كبيراً في إيواء هذه الدواجن فلا توضع مثلاً داخل حظائر مغلقة أو مسقوفة تقيها من الرياح والأمطار . إنّ عدم وضع الدواجن داخل حظائر خاصة يجعلها تتجول في المنازل والحقول وتسبب أضراراً . وكثير منها يقع فريسة للأمراض خارج الحظائر الخاصة بها وعندما تصاب دجاجة بمرض معد سرعان ما تصاب به جميع الدجاجات الأخرى في المنطقة . كما أن الدجاجة المريضة لا تنمو بصورة جيدة بل غالباً ما تموت ومن جهة أخرى أعداداً كبيرة منها تموت وهي صغيرة السن وذلك بسبب الأمراض والحيوانات المفترسة وقلة العناية وسوء التغذية . إنّ الدواجن التي ليست من سلالات جيّدة يكون نموها محدوداً وإنتاجها من اللحم ضعيفاً .


2 - تحسين الإنتاج بالتأثير على التغذية**النشاط الثاني : كيف يمكن تحسين إنتاج الدجاج بالتأثير على الغذاء؟**

سجل قطاع دجاج اللحم في تونس منذ الثمانينات تطوّراً كبيراً على مستوى الإنتاج و نوعية المنتج. و استطاع بفضل تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي. و تعتمد تربية الدواجن على أسس و قواعد علمية و صحية و فنية يتحتم على كل مربي أن يكون متمكناً منها إضافة إلى ضرورة متابعة التطورات العالمية في مجال تقنيات التربية. و من المهام التي يضطلع بها الجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن هو مساعدة المهنيين على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بغية تحسين معدّلات الإنتاج و تحسينهم لتأهيل منشأتهم.

• بالاعتماد على الوثيقتين 40 و 41 فسّر كيف أنّ التغذية الملائمة تساعد على تحسين إنتاج الدواجن.

الوثيقة 40: تقديم العلف والماء :

توضع في بيوت تربية الدجاج حواجز دائرية الشكل قطرها لا يقل على 4 م لـ 500 فرخ وعلوها 40 سم و يمكن أن تكون من مادة الكرتون أو حديدية مغلقة بالبلاستيك و ينبغي تغيير الكرتون أو البلاستيك في كل دورة. يقع وضع معدات التربية داخل الحواجز طبقاً للرسم التالي (الوثيقة 40).



للعلف القسط الأوفر في تكلفة المنتج وجودة العلف لا تعني القيمة الغذائية التي يوفرها فحسب. بل تعني أيضا خلوه من الجراثيم والفطريات ومن روائح التعفن والتخمر. يمثل العلف نسبة تفوق 65% من التكلفة الجمالية للإنتاج. لذا يجب الحرص على المحافظة على جودة العلف بخرنه في مكان جاف ونظيف وبعيد عن الرطوبة والحرارة. و حمايته من الحشرات و الفئران و الطيور البرية.

و نقدم فيما يلي و على سبيل البيان كميات استهلاك العلف و الماء علما و أنها تختلف حسب نوعية العلف و حسب سلالة الفراخ :

كمية الماء (مل في اليوم) * حسب الحرارة		كمية العلف (غرام في اليوم)	العمر (أسبوع)
32 °C مئوية	21 °C مئوية		
30	30	21	1
90	60	43	2
200	90	69	3
270	130	101	4
360	170	134	5
420	220	169	6
460	250	197	7

جدول يبيّن تغير حاجيات كمّيّة العلف و الماء عند الفراخ حسب العمر

* تقدّر كمية الماء المستهلكة بـ 1,7 إلى 1,8 من كمية العلف و تصل إلى ضعف هذا التقدير في مناخ معتدل كما أنّها تزداد في فترات الشهيلى .
من المؤشرات التي تمكننا من تقييم عملية التربية هي نسبة التحويل وهي تتمثل في كمية العلف اللازمة لإنتاج 1 كغ من الدجاج الحيّ .

مثال:

معدل الأوزان للدجاج الحي: 2 كغ حي
معدّل كمية العلف المستهلكة: 4.4 كغ من العلف لكل طير

$$\text{تكون النسبة المئوية للتحويل} = \frac{2 \times 100}{4.4} = 45.4\%$$

و تعتبر هذه النتيجة في هذا المثال مرتفعة نسبيا حيث أنّ نسبة التحويل في البلدان المتقدمة في ميدان الدواجن تتراوح بين 52.63 % و 55.55 % .

الوثيقة 41 : مراقبة الأوزان و نسبة التجانس:

تقع مراقبة أوزان الطيور أسبوعيا للتحقق من حسن نموها وللتأكد من قرب الأوزان للمقاييس المستهدفة حسب العمر وحسب السلالة . أما نسبة تجانس القطيع فإنها تعطي فكرة أوضح عن تفاوت الأوزان في القطيع ، كما تمكن من إبراز بعض أخطاء التربية التي قد تحصل مثل عدم احترام كثافة الطيور و مقاييس معدات التربية .

يقع وزن عيّنة من الطيور بدون اختيار تمثل نسبة 1 % من القطيع وبأماكن مختلفة من المدجنة . ويتم تدوين هذه الأوزان . وبعد جمعها وقسمتها على عدد الطيور الموزونة . نستنتج المعدل للطير الواحد .

ولمعرفة نسبة تجانس الفوج . يقع تعداد الطيور التي تكون أوزانها منحصرة بين معدل الوزن ناقص 10 % و بين معدل الوزن زائد 10 % .


مثلا إذا كان معدل وزن الطيور 1500 غرام:

$$\text{فالحد الأدنى هو معدل الوزن} - 10\% = 1500 - 150 = 1350 \text{ غرام}$$

$$\text{و الحد الأقصى هو معدل الوزن} + 10\% = 1500 + 150 = 1650 \text{ غرام.}$$

ويعتبر الفوج متجانسا إذا كان 75 بالمائة من هذه العيّنة تتراوح أوزانها بين الحدين الأدنى والأقصى وإلا فإن القطيع غير متجانس ويجب البحث عن الأخطاء لتداركها في الإبان .

ويمكن في هذه الحالة فرز الطيور الأقل وزنا ووضعها على حده بقسيمة بالمدجنة لزيادة العناية بها بتوفير أكثر عدد من المشارب والمعالف حتى تلتحق بالأوزان المرغوبة .



الوثيقة 41: الرسوم البيانية لنمو كتلة الدجاج
المنتج للبيض وكتلة الغذاء المستهلكة

الخلاصة

تتطلب أساليب التربية الحديثة للدواجن الاعتناء بعلفها إلى درجة كبيرة، لكي تنمو بسرعة وتعطي قدراً كبيراً من اللحم ومن البيض . إن تغذية الدواجن ليست أمراً سهلاً فهي تحتاج إلى مجموعة كبيرة من الأعلاف ذي قيمة غذائية عالية. تحتاج الدجاجة البيوضة بشكل خاص إلى علف غني بالبروتين والكالسيوم ويحتوي على الكمية المناسبة من عناصر غذائية أخرى .

تربى الأبقار لإنتاج اللحوم الحمراء والحليب .

إن الوجبة الغذائية التي تعطى للأبقار تهدف إلى :

- 1 - المحافظة على حياتها (الوجبة المحافظة) .
- 2 - تأمين المواد الغذائية اللازمة لإنتاج الحليب (الوجبة الإنتاجية) .
- 3 - نمو الجسم إذا كانت البقرة في طور النمو (وجبة النمو) . يتوقف النمو بعد العام الثالث.
- 4 - تيسير النهوض بأعباء الحمل والولادة (وجبة الحمل)

يتم تغذية وتقديم الأعلاف للأسمك في المزارع السمكية تختلف كمية العلف التي تقدم للأسمك يوميا تبعاً لحجم ووزن الأسماك ودرجة حرارة المياه والحالة الصحية للأسمك و نسبة الأكسجين الذائب في المياه.



تقديم الأعلاف للأسمك

التمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة و التطبيق.



الوثيقة 42

يتمّ تربية أسماك البلطي النيلي (الوثيقة 42) بالسود والبحيرات في الجنوب التونسي وقد استنبط الباحثون تركيبات علفية مكوّنة من طحين السمك.

يبين الجدول (الوثيقة 43) معدّلات تغذية أسماك البلطي وعلاقتها بالطول والوزن .

• يقدر معدّل التغذية اليومي كنسبة مائوية من وزن السمكة %4، كان عدد الأسماك المستزرعة في أحد الأحواض 350 سمكة خلال موسم التربية أخذ المزارع عيّنة من أسماك الحوض وقام بقياس طولها فكان متوسط الطول 15.5صم ومتوسط الوزن 85 غ للسمكة الواحدة.

المراحل	معدل طول السمكة (صم)	معدّل وزن السمكة (غ)	المعدّل اليومي لـ % للتغذية بالنسبة إلى وزن السمكة
1	2.0	1.0	7 %
2	3.0	5.0	6 %
3	9.5	20.0	5 %
4	14	60.0	4 %
5	16.5	100.0	3 %
6	19.5	150.0	2.5 %

الوثيقة 43

1 - بالاعتماد على الجدول قارن عبر المراحل :

أ - المعدّل اليومي للتغذية .

ب - علاقة التغذية بمعدّل الطول والوزن .

2 - أ - أحسب الوزن الكلي للأسماك المستزرعة في أحد الأحواض .

ب - أحسب كميّة العلف اليومي اللازمة لتغذية أسماك الحوض .

التغذية عند الأرانب

إن ارتفاع أسعار أعلاف الأرانب يشكل جزءاً كبيراً من تكاليف إنتاجها وقد تصل إلى 70% من هذه التكاليف، والمربي الماهر هو الذي يعمل على تأمين كافة الأعلاف اللازمة لقطيعه من إنتاج مزرعته لأن الغاية الأساسية من التربية هي الحصول على أكبر إنتاج بأقل التكاليف. هذا ولا تختلف أعلاف الأرانب عن أعلاف الدواجن من حيث تركيبها إلا أنها تختلف من حيث أنواعها لأن الأرانب حيوانات ثديية تأكل الأعشاب وتقضم الحبوب والجزر. ولهذا لا تحتاج الأرانب إلى بروتين حيواني لأن لها المقدرة على تكوينه في أجسامها و في كل الأحوال عند تجهيز وجبة خاصة بالأرانب يجب أن نراعي حاجة القطيع بصورة عامة : الوجبة المخصصة لإنتاج اللحم (وجبة تسمين) والوجبة المخصصة لإنتاج الفراء أو الشعر (وجبة تربية ونمو).

ومهما تنوعت حاجات القطعان والأرانب المختلفة المرباة من حيث نوعية الأعلاف المقدمة لها وكميتها فإنها تحتاج للمواد التالية :

1 - المواد البروتينية وهي مواد مهمة جداً في فترات النمو والحمل والرضاعة وهي تتوفر في كافة أنواع الأعشاب النباتية وكذلك في الحبوب البقولية وهي ضرورية للنمو وتكوين الأجنة وزيادة إنتاج الحليب عند المرضعات لذلك لابد من توفرها في وجبات الأرانب وتشكل نسبة 15-25% من وتضاف المواد الدهنية في أعلاف الأرانب بنسبة 3.5% وفي أرانب التسمين بنسبة تصل إلى 5.5%.

2 - المواد السكرية وهي مواد نشوية ضرورية في وجبات الأرانب (نسبة 70% من تركيبة الوجبات) إنّ مصدر هذه المواد السكرية هو الحبوب النشوية بأنواعها ويفضل تقديمها مجروشة وخصوصاً الذرة الصفراء أو البيضاء . هذا وتحتاج الأرانب إلى نسبة عالية من الألياف 14-18% لتفادي أكل الفراء .

3 - الإضافات العلفية التي تشمل :

أ- الأملاح المعدنية: وعلى الأخص الكالسيوم والفوسفور وملح الطعام الذي يضاف إلى وجبات الأرانب بنسبة 0.5-1.5 % من وزن وجبات الأرانب في مزارع التربية والتسمين.

ب - الفيتامينات : أصبحت مواد لاغنى عنها في مزارع الأرانب لزيادة نموها والحفاظ على صحتها وتكثر عادة في الأعلاف الخضراء والبقوليات.

ج - المضادات الحيوية: قد تضاف إلى وجبات الأرانب من أجل العلاج حتى يتحقق النمو في ظروف صحيّة جيّدة

تعتبر فضلات المطاعم والمطاحن وخصوصاً منها ذات الأصل النباتي صالحة لتغذية الأرانب وقد يستعمل الحليب المجفف أو اللبن المفروز في تغذية الأرانب وعلى وجه العموم يمكن تقسيم أعلاف الأرانب إلى الآتي :

- 1 - مواد علفية خضراء وتقسّم بدورها إلى أعلاف خضراء رطبة وأعلاف خضراء جافة.
- 2 - مواد علفية مركزة تشمل المواد التي تدخل في تغذية الحيوانات الأخرى مثل الشعير والشوفان والذرة و القمح و بذور الكتان. ويجب جرش هذه المواد قبل استعمالها.

أما الأعلاف الخضراء فهي تشمل كافة أنواع الحشائش الخضراء والدريس باستثناء الحشائش السامة وهي ضرورية للأرانب نظراً لاحتوائها على الفيتامينات والبروتين والأملاح المعدنية وتستعمل للأرانب الوالدة بشكل خاص والمرضعات منها وعند قلة الأعلاف الخضراء يمكن استعمال الجذور النباتية مثل الجزر و اللفت بشكل مجزأ ويفضل أيضاً أن تكون نصف مسلوقة ومبردة ويشترط عدم تقديم هذه الأعلاف وهي متخمرة أو مختلطة مع أعشاب غريبة ضارة أو سامة كما لاينصح بتقديمها إلى الأرانب إلا بعد إعطائها وجبة الأعلاف المركزة و فيما يلي احتياجات الأرانب للمواد الغذائية ونسبة كل منها:

أنواع المواد العلفية	أرانب تربية	أرانب تسمين	أرانب حامله	أرانب مرضعة	أرانب غير حامله
البروتينات	16	18	13	18	14
الدهون	3.5	5.5	3.5	4	3.5
سكريات خام	43	47	44	50	43
الألياف	18 - 14	14 - 10	14	10	20 - 14
فيتامينات وحدة دولية					
فيتامين A	1000	1000	1500	2500	900
فيتامين D	100	100	150	200	100
الكحولية ملح	300	300	300	500	200
أملاح معدنية:					
كالسيوم	كميات أقل من هذه				1.84 - 1.8 %
فوسفور					1.33 - 1.29 %
ملح الطعام					0.5 - 0.3
كميات أقل من هذه					

تغذية الأسماك

تعتبر التغذية عاملاً هاماً لنجاح الاستزراع السمكي ذلك أنّ توفير الغذاء المناسب للأسماك يضمن الحصول على معدلات نمو عالية وحالة صحية جيدة ومقاومة عالية للمسببات المرضية المختلفة . تتغذى الأسماك في الطبيعة (البحار والأنهار) على الغذاء الطبيعي المتوفر في هذه الأماكن من أسماك صغيرة و قشريات و قواقع و بلانكتون (الهائمات الحيوانية والطحالب النباتية وحيدة الخلية وغيرها)

أما في حالة الاستزراع السمكي فيتم إعداد أعلاف صناعية متوازنة تلبى كافة الاحتياجات الغذائية للأسماك وتصنع هذه الأعلاف من مواد كثيرة فيها مسحوق السمك ومسحوق اللحم و فول الصويا والذرة الصفراء و مخلوط الفيتامينات والأملاح المعدنية و زيت السمك و مكسبات طعم ورائحة و مواد ماسكة وغيرها .

الاحتياجات الغذائية للأسماك: تتشابه الاحتياجات الغذائية للأسماك مع الاحتياجات الغذائية للحيوانات الأرضية فهي تحتاج إلى البروتين و الطاقة و السكريات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية للنمو والتكاثر وأداء الوظائف الحيوية الأخرى .

البروتين: تحتاج الأسماك إلى أعلاف ذات نسبة بروتين عالية بالمقارنة بالدواجن والحيوانات الأرضية الأخرى . ويرجع ذلك إلى أن محتوى البروتين في المادة الجافة لأجسام الأسماك يتراوح من 60 إلى 93 % ومن ثم يفهم لماذا تحتاج الأسماك إلى نسبة عالية للبروتين في الأعلاف هذا بالإضافة إلى أن الغذاء الطبيعي للأسماك تتراوح نسبة البروتين به من 60 إلى 70 % .

الطاقة: توجد اختلافات واضحة بين احتياجات الأسماك للطاقة واحتياجات الحيوانات الأرضية لها حيث أن احتياجات الأسماك للطاقة تعتبر قليلة .

السكريات: تستطيع الأسماك بسهولة أن تهضم السكريات الأولية ولكن السكريات المركبة ذات الحجم الكبير فإنها لا تهضم بصورة جيدة . تستخدم الأسماك السكريات كمصدر للطاقة كذلك البروتين في حالة نقص السكريات أمّا في حالة زيادة السكريات فإن ذلك يؤدي إلى تراكم الجليكوجين و الدهون في الكبد والمعثكلة .

الدهون: للدهون وظائف عديدة للأسماك فهي تستخدم كمصدر أساسي للطاقة ولحماية الأعضاء الحيوية الداخلية و لها دور فعال في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون .

الفيتامينات: نادراً ما تصاب الأسماك الموجودة في الطبيعة بأعراض نقص الفيتامينات ولكن الأسماك المستزرعة في أحواض ذات مساحات محدودة والتي تعتمد في غذائها على الصناعية قد تصاب بأعراض نقص الفيتامينات إذا كان تركيز الفيتامينات في العلف قليلاً لذا كان توفير الفيتامينات في الأعلاف الاصطناعية للأسماك أساسياً .

الأملاح المعدنية: تحتاج الأسماك إلى نفس الأملاح المعدنية التي تحتاجها الحيوانات ذوات الدم الحار لبناء الأنسجة ولأداء مختلف العمليات الحيوية .

طرق تغذية الأسماك في المزارع السمكية :

يتم تغذية وتقديم الأعلاف للأسماك في المزارع السمكية بإحدى الطريقتين التاليتين :



الوثيقة 44

التغذية اليدوية :


يتم من خلالها تقديم الأعلاف للأسماك بصورة يومية إما عن طريق نثرها على سطح المياه في أماكن مخصصة بالحوض (الوثيقة 44) أو بوضعها في طاوولات التغذية والتي تكون مغمورة تحت سطح المياه بحوالي 10 سم وتكون موزعة على جانبي الحوض.

التغذية الآلية :

تستخدم هذه الطريقة في النظام المكثف لتربية الأسماك ويتم ذلك باستخدام المغذيات الآلية التي تقوم بتوزيع ونثر العلف في المياه بصورة آلية أو حسب الطلب. (الوثيقة 46)



الوثيقة 45 : علب علف الأسماك



الوثيقة 46 : نثر العلف

للأسماك بطريقة آلية

تتكاثر الحيوانات طبيعيا داخل وسط عيشها و بذلك تحافظ على استمراريتها . يتدخل الإنسان أحيانا فيقوم بتربية بعض الحيوانات البيوضة كالدجاج (الوثيقة 1) و الولودة كالأرانب (الوثيقة 2) و يعتني بها قصد تحسين إنتاجها.

• كيف يمكن تحسين إنتاج الحيوانات كالطيور بالتأثير على تكاثرها ؟



الوثيقة 1 : دجاجة تخضن بيضها



الوثيقة 2 : أرنب أنثى مع صغارها

مكتسباتي السابقة :

- التمييز بين الحيوانات البيوضة والحيوانات الولودة (3 أساسي).
- تتكاثر الحيوانات البيوضة عن طريق وضع البيض (3 أساسي)



دجاجة مع فراخها



حمل يرضع نعجة

فهرس المحور الثاني

الدرس 1 : التكاثر عند الطيور.

الدرس 2 : تحسين إنتاج بعض الحيوانات بالتأثير على تكاثرها.

تضع أنثى الطيور البيض الذي يتحول بعد حضنه إلى فراخ تشبه الأبوين ويتم الحضن بصفة طبيعية (الوثيقة 3) أو بواسطة المحضنة الإصطناعية (الوثيقة 4).

• كيف تتكون الفراخ بواسطة التكاثر الجنسي بين الذكر و الأنثى (الوثيقة 5)؟



الوثيقة 4 : تفقس البيض و خروج الفراخ داخل المحضنة الاصطناعيّة



الوثيقة 3 : بطة مع فراخها



الوثيقة 5 : الديك و الدجاجة صحبة الفراخ

1 - البيضة و مصدرها

النشاط الأول: التعرف إلى مكونات البيضة عند الطيور

الطيور حيوانات بيوضة : تضع الأنثى البيض الذي يتحول بعد حضنه إلى فراخ .

1 - قارن لون قشرة البيض عند الدجاج (الوثيقة 6)

2 - افتح بيضة دجاج بكسر قشرتها و تعرف إلى أجزائها الأساسية.

3 - صف أجزاء بيضة الدجاج من الخارج إلى الداخل (يمكن الاستعانة بالوثيقة 7)




الوثيقة 7: مكونات البيضة




الوثيقة 6: بيض دجاج

النشاط الثاني: التعرف إلى مراحل تكون البيضة

1 - شاهد نتيجة تشريح جسم الدجاجة و تعرف إلى مكونات الجهاز التناسلي عندها في مستوى البطن (الوثيقة 8).



(ب)



(أ)

الوثيقة 8 : الجهاز التناسلي الأنثوي : نتيجة التشريح (أ) و رسم توضيحي (ب)

- 2 - هل يوجد بيض ناضج داخل الجهاز التناسلي للدجاجة؟
 3 - ابحث عن أصل البيضة.
 4 - تعرّف إلى بعض مراحل تكون البيضة.

النشاط الثالث: مقارنة بيضة ملقحة و بيضة غير ملقحة

الملاحظات:


- بيض دجاجة منعزلة لا يعطي فراخا بعد حضنه.
- بيض دجاجة تعيش مع ديك يعطي فراخا بعد حضنه.

الافتراض:

يتطلب الحصول على فراخ وجود تكاثر جنسي بين الذكر (الديك) و الأنثى (الدجاجة).


التجربة:

- عزلنا دجاجة في قفص فأعطت البيضة 1 (انظر الوثيقة 9).
- عزلنا ديكا و دجاجة في قفص ثان فحصلنا على البيضة 2 (انظر الوثيقة 10).




الوثيقة 9 : رسم توضيحي لمكونات

بيضة غير ملقحة (البيضة 1)



(ب)



(أ)


الوثيقة 10: البيضة الملقحة (2): صورة تبرز المكونات (أ) و رسم توضيحي (ب)

1 - قارن مكونات البيضة 1 و البيضة 2 .

2 - ماذا تستنتج بخصوص وجهة الفرضية ؟

النشاط الرابع : تبيين دور كل من الجهاز التناسلي الذكري والجهاز التناسلي الأنثوي

1 - شاهد نتيجة تشريح الديك و تعرف إلى مكونات جهازه التناسلي



الوثيقة 11 : الجهاز التناسلي الذكري : نتيجة التشريح (أ) و رسم توضيحي (ب)

2 - استنتج الأعضاء المتشابهة وظيفيا في الجهاز التناسلي الذكري و الجهاز التناسلي الأنثوي عند الدجاج و دوّن ذلك في الجدول التالي بعد نقله على كراسك .


الوظائف المتشابهة	أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي	أعضاء الجهاز التناسلي الذكري	
			غدد تناسليّة
			مسالك تناسليّة
			فتحة تناسليّة

2 - تكون الفرخ بواسطة التكاثر الجنسي :

النشاط الخامس: تبين المراحل المؤدية إلى تكوين الفرخ

أ - الإلقاح أو الإخصاب:

يقذف الديك عند السفاد سائلًا منويًا في الفتحة التناسلية للدجاجة. يحتوي هذا السائل على خلايا خيطية متحركة تعرف بالحيوانات المنوية أو الأمشاج الذكرية، و بعد انتقالها داخل المسالك الجنسية الأنثوية تحيط بالبويضة في مستوى الجزء العلوي لقناة البيض . يدخل حيوان منوي واحد في البويضة ثم تتحد نواته مع نواتها فتتكون خلية بيضة (الإلقاح) تخضع هذه الخلية إلى عدة انقسامات لتعطي خلايا الجنين . يمثل الرسم التالي (الوثيقة 12) أهم المراحل المؤدية إلى تكوين البيضة الملقحة.




الوثيقة 12: مراحل الإلقاح

- 1 - ماهو مكان وقوع الإلقاح ؟
- 2 - حدد مفهوم الإلقاح .
- 3 - اذكر مراحل الإلقاح .
- 4 - بين مدى أهمية هذا الحدث .

ب - التفريخ:

تقوم الدجاجة بحضن البيض الملقح لمدة ثلاثة أسابيع و في نهاية الحضن يكسر الفرخ القشرة الكلسية بمنقاره و يخرج من البيضة.




اليوم الرابع من الحضن



اليوم الأول من الحضن



اليوم العشرون من الحضن



اليوم السابع من الحضن

الوثيقة 13 : أطوار التفريخ

- 1 - ماذا يحدث للجنين أثناء فترة الحضن؟
- 2 - كيف يتغذى الجنين خلال هذه الفترة؟

3 - العوامل الملائمة للتفريخ

النشاط السادس: تحديد الشروط الضرورية لتحول الجنين إلى فرخ

- ملاحظة 1 : يتحول الجنين تدريجيا إلى فرخ أثناء فترة الحضان وتقوم الدجاجة أثناء هذه الفترة بتحريك البيض.
- ملاحظة 2 : يمكن الحصول على فراخ في نفس المدة الزمنية باستعمال المحضنة الاصطناعية (الوثيقة 14).



الوثيقة 14 : محضنة اصطناعية

- 1 - اذكر الظروف التي يمكن أن يوفرها كل من الحضان الطبيعي للبيض و الحضان الاصطناعي.
- 2 - أدل بفرضيات بخصوص العلاقة بين هذه الظروف و حدوث التفريخ .
- 3 - اقترح تجارب للتأكد من صحة هذه الفرضيات .
- 4 - حلل النتائج التجريبية التالية و استنتج العوامل الضرورية لحدوث التفريخ .

التجارب :

رقم التجربة	الحرارة	التهوية	الرطوبة	قلب البيض	النتيجة (التفريخ)
1	42 °C - 40 °C	+	وجود بخار الماء	-	-
2	42 °C - 40 °C	** (مطلي بالبرنيق)	وجود بخار الماء	+	-
3	42 °C - 40 °C	+	هواء جاف	+	-
4	20 °C	+	وجود بخار الماء	+	-
5	42 °C - 40 °C	+	وجود بخار الماء	+	+

** تطفى قشرة البيضة بالبرنيق خلال فترة الحضان لسد الثغور و منع مرور الغازات التنفسية.

الخلاصة

تتكاثر الطيور عن طريق وضع البيض فهي حيوانات بيوضة .
تتكون البويضة عند الأنثى في المبيض ثم تغادره بعد نضجها إلى قناة البيض حيث تخاط
بالآح ثم بالغشائين و القشرة الكلسية فتتحول تدريجيا إلى بيضة.

1 - مكونات البيضة

- أ - مكونات بيضة غير ملقحة
تخاط بيضة الدجاجة بقشرة كلسية رقيقة . و تحتوي على المح أو أصفر البيض و الآح أو
أبيض البيض الذي يحيط بالمح.
ب - مكونات بيضة ملقحة
تحتوي البيضة الملقحة على المكونات السابقة الذكر و على الجنين الذي يتكون إثر الإلقاح .

2 - الجهاز التناسلي عند الدجاج

- أ - الجهاز التناسلي الذكري
يتكون الجهاز التناسلي الذكري من :
• الغدد التناسلية : الخصيتان و هي تقوم بإنتاج الحيوانات المنوية (الأمشاج الذكرية)
• المسالك التناسلية : القناتان المنويتان
• الفتحة التناسلية : المقذرة
ب - الجهاز التناسلي الأنثوي
يتكون الجهاز التناسلي الأنثوي من :
• الغدد التناسلية : المبيض الذي يحتوي على عدد كبير من الكريات الصفراء مختلفة
الحجم التي تمثل البويضات و هي الخلايا التناسلية الأنثوية.
• المسالك التناسلية : عندما تتم البويضة نضجها داخل المبيض تغادره إلى القمع في الجزء
العلوي لقناة البيض ثم تنتقل تدريجيا إلى الجزء السفلي حيث تخاط تدريجيا بالآح ثم تخاط
في الجزء السفلي لقناة البيض بغشائين رقيقين و بغلاف كلسي واق.
تستغرق عملية تكوين البيضة في المسالك الأنثوية حوالي 24 ساعة تصل إثرها إلى فتحة
البيض و منها تطرح إلى الخارج .
• الفتحة التناسلية : المقذرة

3 - المراحل الضرورية لتكوين الفرخ

- أ - الإلقاح أو الإخصاب
يقذف الديك عند السفاد سائلًا منويًا في المسالك التناسلية للدجاجة ويحتوي هذا السائل على
خلايا سوطية متحركة تعرف بالحيوانات المنوية و هي تمثل الخلايا التناسلية الذكرية
أو الأمشاج الذكرية.

تصعد الحيوانات المنوية إلى الجزء العلوي لقناة البيض و تحيط بالبويضة ثم يدخل أحد الأمشاج الذكورية إلى البويضة و تتحد نواته مع نواتها فتتكون الخلية البيضة. تعرف هذه الظاهرة بالإلقاح أو الإخصاب.

يتم الإلقاح عند الدجاجة في المسالك التناسلية فهو إلقاح داخلي تتحول إثره البيضة غير المخصبة إلى بيضة مخصبة . تخضع الخلية البيضة لعدة انقسامات فيتكون الجنين و هو متعدد الخلايا .

ب - التفريخ

تحضن الطيور بيضها فترة معينة تختلف باختلاف نوع الطيور يتحول خلالها الجنين إلى فرخ و هو ما يعرف بالتفريخ . أمثلة : * 21 يوما عند الدجاج

* 18 يوما عند الحمام و السمان

* 28 يوما عند الديك الرومي و البط

يكتفي الجنين خلال هذه الفترة باستهلاك مخدرات البيضة المتمثلة في المح و الأح لتغذيته و بناء مختلف أنسجته كما يمتص الأملاح الكلسية المتوفرة في القشرة لبناء العظام و نموها خلال فترة التفريخ.

ج - العوامل الملائمة للتفريخ

يتطلب التفريخ عوامل ضرورية لابد من توفرها عند الحضن و هي:

• **التهوية:** يحتاج الجنين إلى كتلة من الأكسجين للتنفس يتحصل عليها عبر ثغور القشرة الكلسية.

• **الرطوبة:** تعتبر الرطوبة ضرورية لتطور الجنين و تحوله إلى فرخ.

• **الحرارة:** الحرارة المثلى للتفريخ عند الدجاج هي 40°C . تمكن الحرارة الملائمة

الجنين من الخروج من كموونه و استئناف تطوره إلى فرخ.

• **عملية قلب البيض:** تقلب الدجاجة البيض بمعدل أربع مرات في اليوم و ذلك خلال

الفترة الممتدة من اليوم الثاني إلى اليوم التاسع عشر من الحضن. تهدف عملية تحريك البيض و قلبه إلى منع التصاق المح بالقشرة الكلسية.

في نهاية الحضن يكسر الفرخ القشرة الكلسية بمنقاره و يخرج من البيضة و يعرف ذلك بالتفقس.



التمرين 1 :

الهدف : اختبار القدرة على التذكر

أ - اربط بسهم بين كل عبارة و التعريف المناسب لها:


- | | |
|-----------|--|
| 1 التفريخ | ○ قذف الديك للحيوانات المنوية داخل الفتحة الأنثوية |
| 2 التفقس | ○ تحول الجنين إلى فرخ أثناء الحضن |
| 3 الإلقاح | ○ خروج الفرخ من البيضة |
| 4 السفاد | ○ اندماج البويضة و الحيوان المنوي للحصول على جنين |

ب - رتب هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمني مستعينا بالأرقام من 1 إلى 4.

التمرين 2 :

الهدف : اختبار القدرة على الفهم

تمثل الوثيقة التالية مراحل تكوين البيضة الملقحة عند الدجاجة :



تعرف إلى الأحداث المبينة بالحروف أ ، ب ، ج .

اكتب البيانات المناسبة وفق الأرقام.

ضع خطأ أو صواب أمام الجمل التالية (بعد نقله على كراسك)

أ- تضع الدجاجة بيضا بوجود أو بدون وجود ديك	
ب- تعطي البيضة المحضنة دائما فراخا	
ج- وجود الديك ضروري للحصول على فراخ	
د- لا تبيض الدجاجة إلا إذا كان الديك موجودا بالمدجنة	
هـ- يمكن للدجاجة التي ليس معها ديك أن تقوم بوظيفة التكاثر	


التمرين 3 :

الهدف : اختبار القدرة على التحليل والمقارنة

1) للتعرف إلى دور أجزاء البيضة في عملية التفريخ قمنا بوزن كل جزء من أجزاء البيضة خلال فترة الحضانة و سجلنا النتائج في الجدول التالي :

الكتلة بالغرام			
الجنين	القشرة الكلسية	الآح و المح	مدة الحضانة
حوالي الصفر	5	50	0
2	4.5	42	7 أيام
9	4	30	14 يوما
40	3	0	21 يوما

أ - قارن كتلة المح و الآح و القشرة الكلسية بكتلة الجنين كلما تقدمت فترة الحضانة.



ب - لماذا لا نجد أثرا للمح و الآح بعد الإنفاس ؟

ج - ماهو سبب تناقص كتلة القشرة الكلسية من 5 غرامات إلى 3 غرامات؟

2) يمثل الرسم الجانب الجنين داخل البيضة .

أ - أكتب على كراسك البيانات الموافقة للأرقام

ب - استنتج كيفية التغذية عند الجنين أثناء فترة الحضانة

الإصلاح

التمرين 3 :

1- أ) تبين مقارنة كتلة المح والآح والقشرة الكلسية بكتلة الجنين كلما تقدمت فترة الحضانة. تناقص كتلة المدخرات الغذائية المتمثلة في المح والآح والقشرة الكلسية وتزايد كتلة الجنين. ب) لا نجد أثر للمح والآح بعد الإنفاس لأن الجنين امتصها وتغذى بها لبناء أنسجة أعضاء جسمه. ج) سبب تناقص كتلة القشرة الكلسية من 5 غرامات إلى 3 غرامات هو أن الجنين امتصها لبناء العظام التي تسند جسمه وتعطيه شكله المميز.

2 - أ) البيانات الموافقة للأرقام :

1- المح ، 2 - أوعية دموية، 3- الآح، 4- غشاء التبادلات الغازية، 5- الجنين، 6- غرفة الهواء. ب) يتغذى الجنين أثناء فترة الحضانة بامتصاص المدخرات الغذائية عبر الأوعية الدموية المتفرعة في المح والآح .

يسعى الإنسان للزيادة في إنتاج الأغذية ذات المصدر الحيواني بالتأثير على تكاثر عدة أنواع من الحيوانات و ذلك باختيار السلالات المناسبة كسلالات الأغنام (الوثيقة 15) والأرانب (الوثيقة 16) و توفير الظروف الملائمة لإكثار أفراد كل نوع كالحمام (الوثيقة 17) .

كيف يتم تحسين إنتاج الحيوانات بالتأثير على تكاثرها الجنسي؟



الوثيقة 15 : سلالات من الأغنام



الوثيقة 16 : سلالات من الأرانب



الوثيقة 17 : سلالات من الحمام

1 - اختيار السلالات :

النشاط الأول: تحديد مفهوم السلالة

تمثل الوثيقتان 18 و 19 سلالتين مختلفتين عند البقر.



الوثيقة 19 : سلالة الأبقار المغاربية



الوثيقة 18 : سلالة الأبقار الهولندية

بالاعتماد على الوثيقتين 18 و 19 :

- اذكر بعض أوجه الاختلاف بين هاتين السلالتين
- حدد مفهوم السلالة

النشاط الثاني: تحديد مميزات السلالة الجيدة

مثال : سلالات البقر

تتميز سلالة الأبقار الهولندية بإنتاجها الوافر للحليب (حوالي 33 لترا في اليوم لمدة 100 يوم في السنة) غير أن هذه السلالة لا تقاوم الأمراض كما يجب و لا تتأقلم مع العوامل المناخية القاسية و من محاسن سلالة الأبقار المغاربية قدرتها على مقاومة الأمراض و تأقلمها مع العوامل المناخية غير أن هذه السلالة قليلة إنتاج الحليب (حوالي 7 لترات في اليوم لمدة 50 يوما في السنة) .

استنادا إلى النص بين أهمية اختيار السلالات بالنسبة إلى الفلاح .

2 - تحسين الإنتاج عند بعض الطيور

النشاط الثالث : تحديد الظروف الملائمة لتربية بعض الطيور

- يقوم الإنسان بتربية بعض الطيور و يعتني بها قصد تحسين إنتاجها .
1 - شاهد الوثائق التالية ثم تعرف إلى الظروف التي يجب توفيرها لتربية الطيور .



الوثيقة 21: تقديم الغذاء للدجاج

الوثيقة 20: التغذية عند الفراخ

- 2 - ابحث عبر شبكة الأنترنت عن الظروف الملائمة لتربية الطيور .
3 - قم بتربية أحد أنواع الطيور (حمام ، ديك رومي ، دجاج) واعمل على تحسين إنتاجه مستعينا بالمعلومات الموجودة في شبكة الأنترنت .

3 - تحسين الإنتاج عند بعض الثدييات

النشاط الرابع : تحديد الظروف الملائمة لتربية بعض الثدييات

مثال : الأرنب



الأرنب حيوان صغير حساس لكل تغير مفاجئ بالمحيط الذي يعيش فيه . و لإنتاج تربية الأرانب من سلالات مختارة يجب إحاطتها بالعناية والرعاية الكافية المتمثلة في المسكن و المناخ و التغذية و الظروف الملائمة للتكاثر .

الوثيقة 22

- 1 - استخرج من خلال الوثيقة الظروف الملائمة لتربية الأرانب .
2 - أجز بحثنا بواسطة الأنترنت يبرز تأثير نوعية التغذية و ظروف التكاثر على إنتاج الأرانب.
3 - قم بتربية حيوان أليف (أرنب ، خروف...) بالاعتماد على ما تعلمته بخصوص التغذية و التكاثر.

الخلاصة

قصد تحسين الإنتاج الحيواني كما و كيفا يعمل الإنسان على إتباع المراحل التالية :

1 - انتقاء السلالات

يختار الفلاح بعض السلالات الحيوانية دون غيرها لميزة معينة أو أكثر و يعمل على تربيتها و تكاثرها مثال : سلالة الدجاج الأبيض التي تتميز بسرعة النمو و وفرة إنتاج اللحم.



السلالة هي مجموع الكائنات الحية من نفس النوع و تتميز بصفة وراثية معينة (لون الفرو. لون الريش . شكل الأذنين) .

2 - توفير الظروف الملائمة للتكاثر مثال : عند الطيور

يكون ذلك من خلال :

أ - إعداد مكان مناسب لوضع البيض : يمكن استعمال المحضنة الاصطناعية للحصول على أكبر عدد ممكن من البيض .

ب - توفير غذاء متوازن : يحتوي على كل متطلبات الحيوان من أغذية طاقية و أغذية بناءة و وظيفية.

ج - الحرص على نظافة العش

د - العناية بصحة الحيوان : بالوقاية من الأمراض التي تنتج خاصة عن الطفيليات (القمل، الجرب...) أو البكتيريا (الكوليرا) أو الفيروسات (إنفلونزا الطيور) و بتوفير غذاء متوازن لتفادي أمراض سوء التغذية .

3 - تربية بعض الثدييات مثال : الأرنب

تعتبر الأرنب من الحيوانات كثيرة الإنتاج و لتأمين هذا الإنتاج يجب :

- انتقاء السلالات التي تتميز بالخصوبة و سرعة النمو و التكيف مع الوسط .
- اختيار المكان المناسب لتربية الأرنب .
- تحقيق النظافة و التهوية و التدخل عند الاقتضاء لتعديل الحرارة (تدفئة ..) و الإضاءة.
- توفير المواد الغذائية الضرورية و بالقدر الكافي في الأعلاف .
- التدخل للوقاية من الأمراض و العلاج عند الاقتضاء .

تمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة و التطبيق

أراد فلاح القيام بتربية الدجاج فقرر استشارة أخصائي في ذلك و قد نصحه باختيار أحد السلالات الثلاثة التالية لتربيتها و مده بمعطيات خاصة بكل منها كما يبينه الجدول التالي :

معدل إنتاج البيض في السنة	معدل وزن البيضة الواحدة	معدل وزن الدجاجة	
220 - 200	50 غ	2 - 1.5 كغ	السلالة أ
200 - 170	80 - 75 غ	3.2 - 2.5 كغ	السلالة ب
210 - 200	60 غ	2.5 - 2 كغ	السلالة ج

- 1 - قارن معدل إنتاج البيض بالنسبة لهذه السلالات .
- 2 - استخراج مزايا كل منها .
- 3 - ساعد هذا الفلاح على اختيار سلالة جيدة تضمن له أكثر نسبة ممكنة من الربح .
- 4 - قام هذا الفلاح بتربية إحدى هذه السلالات لكنه لاحظ بعد مدة تساقط الريش عند بعض الدجاج مع نقص في وزن البيض و قشرة كلسية قليلة السمك و سهولة التكسير .
 - أ - ماهي الإجراءات التي يجب على الفلاح اتخاذها لحل هذه المشكلة ؟
 - ب - ماهي السبل الوقائية الواجب إتباعها لتفادي وقوع مخاطر أخرى ؟
 - ج - ابحث بالاستعانة بشبكة الإنترنت عن مخاطر أخرى يمكن أن تهدد صحة الدجاج .

مراقبة تطور الجنين داخل البيضة

1 - كيف يتغذى الجنين داخل البيضة؟


تتفرع عن الجنين أوعية دموية كثيرة و شعيرات دموية رقيقة تنتشر في المح و الآح و تتصل بالقشرة الكلسية لتذيب المدخرات الغذائية ثم تمتصها لتمد الجنين بالغذاء و الطاقة و تزوده بالمواد الأولية لبناء الأنسجة و العظام و تمكنه من التحول تدريجيا إلى فرخ و هو ما يعرف بالتفريخ.



الوثيقة 23 : التفقس و خروج الفرخ من البيضة

2 - فحص البيض :

يتم فحص البيض بمصباح الفحص الضوئي في اليوم السابع و ذلك لاستبعاد البيض غير المحصب ثم يعاد الفحص مرة أخرى في اليوم الرابع عشر لاستبعاد البيض الذي لم يحدث فيه عملية التفريخ.



الوثيقة 24 : مصباح الفحص الضوئي

تربية الطيور و الأرانب

1- تربية طيور الكناري والبيغاء

- نظام غذائي متوازن من الحبوب المنظفة جيدا، أو الفاكهة أو الخضراوات من الجزر أو التفاح أو الخس.
- تغيير الماء باستمرار لضمان نظافتها .
- توفير قفص كبير به أماكن لحماية الطائر من الحر والبرودة والرياح وضوء الشمس المباشر.
- توفير الحركة الملائمة لها بأن يكون هناك مساحة في القفص تساعد على التحرك والطيوان بالداخل.
- مجثم خشبي للطائر للجلوس أو الوقوف عليه.
- تسليية مناسبة داخل القفص : أغصان ، نباتات.
- ماء نظيف للاستحمام .
- احتواء طعامها على البرغل للمساعدة في الهضم.
- تنظيف القفص بانتظام .
- زيارة الطبيب البيطري في حالة المرض أو التعرض للإصابات.
- تحتاج هذه الطيور إلى الحَبَّار لتتغذى عليه.



2- تربية الأرانب

- تعتبر الأرانب من الحيوانات كثيرة الإنتاج حيث يبلغ إنتاجها من اللحم 120 كلغ في السنة و لتأمين وفرة الإنتاج لابد من انتقاء السلالات.
- أ - المكان (المرنبه) : هي المكان المخصص لتربية أرانب من السلالات الرفيعة و يشترط أن يكون هذا المكان بعيدا عن الضوضاء و الطرقات الرئيسية ، قريبا من نقاط الماء و الكهرباء، أن يكون اتجاهه شرقيا أو شرقيا جنوبيا.
- ب - المناخ : كلما كان المناخ داخل المرنبه جيدا كانت النتائج إيجابية و أحسن لتكاثر الأرانب.
- الحرارة :** لها تأثير مباشر على سلوك الأرانب و صحتها و تغذيتها و إنتاجها و من المعلوم أنها لا تتحمل الحرارة المرتفعة و لا المنخفضة و يمكن تفادي ذلك بالتدفئة و التهوية و الرطوبة أو باستعمال مواد البناء العازلة .
- الرطوبة :** إن الأرانب حساسة جدا للرطوبة المنخفضة الأقل من 55% و تعتبر الرطوبة المحبذة بين 65% و 75% لذلك يجب تجنب الرطوبة المرتفعة شتاء بمراقبة تسرب الماء و تحسين الرطوبة صيفا برش الماء على أرضية المرنبه و جدرانها و سقفها مع وضع قطع قماش مبللة على النوافذ من الداخل.

التهوية : تؤثر التهوية الجيدة على صحة الأرناب فهي تسمح بـ :

- جلب الأكسجين الضروري للحياة
- إخراج الهواء الملوث بثاني أكسيد الكربون
- إخراج بخار الماء الناتج عن التنفس و البول
- التخلص من الحرارة المنبعثة من جسم الأرناب

الإضاءة : ضرورة داخل المرنبه لذا يجب أن تكون مساحة النوافذ المخصصة للإضاءة تساوي

20% من المساحة الجمليه مع العلم أن الأرناب الأمهات تحتاج إلى 16 ساعة من الإضاءة لذا

يجب تكمله الإضاءة الطبيعية بالإضاءة الإصطناعية خاصة عندما يكون الطقس مغيما.

ج - التغذية : يشتمل الغذاء على علف مركب متوازن يحتوي على متطلبات الأرناب من

سكريات لتوفير الطاقة و زلايات (بروتيدات) و مواد دسمة و أملاح و ألياف و فيتامينات.

كما يجب توفير الماء بكميات كافية و بنوعية ممتازة (ماء صالح للشرب) .

يسعى الإنسان منذ القدم إلى تدجين بعض الحيوانات (أغنام ، أبقار ، دجاج ، أرانب ...) و تربيتها قصد توفير حاجاته الغذائية من اللحوم و الحليب و البيض ... و لتغطية هذه الحاجات المتزايدة يعمل الفلاح على تحسين الإنتاج الحيواني (لحم ، حليب ، بيض...) بالتأثير على نموه .

كيف يتم تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على نموه ؟



الوثيقة 1 : تربية الدجاج



الوثيقة 2 : تربية الأرانب

فهرس المحور الثالث


- الدرس 1 : دراسة النمو عند بعض الحيوانات.
- الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على النمو.

مكتسباتي السابقة:

- مفهوم النمو عند النبات الأخضر (8 أساسي)
- مفهوم الخلية (7 أساسي)
- مفهوم النسيج (7 أساسي)

تصنيف الحيوانات

- مفهوم الحشرة (7 أساسي)
- مفهوم حيوان ثديي (7 أساسي)
- مفهوم الطيور (7 أساسي)



نجد في كل نوع من الأنواع الحيوانية (أبقار ، أرانب ، أغنام...) عدة سلالات و تتميز كل سلالة بخاصية معينة (سرعة النمو ، وفرة الحليب..). ينتقي الفلاح السلالة التي يرغب فيها و يعمل على تربيتها في ظروف تسمح للحيوان بنمو جيد الوثيقتين 3 و 4 .

كيف نتابع النمو عند الحيوان و كيف نفسره ؟



الوثيقة 3 : أرنب و خرانق



الوثيقة 4 : بقرة و عجل في طور النمو

1 - دراسة نمو حيوان أليف : الأرنب

النشاط الأول: متابعة نمو حيوان أليف (مجموعة من الخرائق مثلا)

ينجز التلاميذ - في مجموعات - هذا النشاط قبل الدرس بثلاثة أشهر و نصف.



الوثيقة 5 : متابعة نمو الأرنب

اختر خرنقا صغيرا (صغير الأرنب) لمتابعة نموه منذ ولادته و قم بقيس طوله(من المنخرين إلى نهاية الذيل) (الوثيقة 5) و وزنه كل 15 يوما و سجل القياسات المتحصل عليها في جدول. انطلاقا من الجدول المتحصل عليه :

- 1 - ابحث عن قيمة النمو في الطول و في الوزن كل نصف شهر.
- 2 - سجل النتائج المتحصل عليها في جدول مواز للجدول السابق.
- 3 - استنتج المعدل الشهري للنمو في الطول و في الوزن من الولادة إلى البلوغ.

النشاط الثاني: إنجاز رسم بياني للنمو الطولي للأرنب


باعتتماد الجدول التالي (الوثيقة 6) أجز رسما بيانيا للنمو الطولي عند الأرنب و ذلك باتباع المراحل التالية:

- ارسم على ورقة مليمتريّة محوري إحداثيات متعامدين.
- سجل على محور الفواصل (الأفقي) عمر الأرانب باليوم و مثل 15 يوما ب 1 صم على الورقة المليمتريّة.
- سجل على محور التراتيب (العمودي) طول الأرنب بالصم و مثل 1 صم ب 2 مليمترا على الورقة المليمتريّة.
- حدد النقاط على الورقة المليمتريّة باعتبار عاملي العمر و الطول.
- اربط هذه النقاط : يمثل الخط المتحصل عليه المنحنى البياني للنمو.

195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0	العمر(باليوم)
40	40	40	39	38.2	37.3	34.5	33.2	33	29.2	26	21.7	17.5	7.5	الطول(بالصم)
1450	1400	1330	1240	1150	1100	1050	980	900	800	730	570	350	220	الوزن(غ)

الوثيقة 6 : جدول النمو في الطول و الوزن عند الأرنب

النشاط الثالث: تحليل الرسم البياني للنمو الطولي للأرنب



الوثيقة 7 : المنحني البياني للنمو في الطول عند الأرنب

- 1 - حدد الفترة التي يتوقف فيها النمو الطولي لهذا الحيوان (الأرنب).
- 2 - حدد عمر الأرنب و طوله عند البلوغ.
- 3 - حدد فترات النمو السريع و البطيء و المستقر عند الأرنب . ماذا تستنتج ؟
- 4 - ارسم المنحني البياني للنمو في الوزن عند نفس الحيوان و ذلك باعتماد الوثيقة 6 .
- 5 - قارن المنحنيين. ماذا تلاحظ ؟

2 - خصائص النمو عند الحشرات :

تمثل الحشرات أكبر نسبة من الحيوانات الموجودة و هي أكثر اللا فقريات انتشارا و تعيش في كل الأوساط و منها ما هو مفيد للإنسان مثل النحل (الوثيقة 8) و منها ما هو جميل مثل الفراشات (الوثيقة 9) و لكن أغلبية الحشرات تسبب ضرا و قلقا للإنسان مثل الجراد (الوثيقة 10) و الذباب و البعوض .



الوثيقة 9 : فراشة فوق زهرة



الوثيقة 8 : مجموعة من النحل




الوثيقة 10 :

جرادة تضع بيضها

كيف تنمو الحشرات ؟

النشاط الأول: متابعة النمو عند الجراد


تضع أنثى الجراد بيضا. تعطي البيضة بعد التفقس يرقة و تبين الوثيقة 11 مختلف أطوار النمو عند إحدى اليرقات بداية من التفقس.



الوثيقة 11 : أطوار النمو عند الجراد

16	15	نهاية اليوم 14	14	13	نهاية اليوم 12	11	10	نهاية اليوم 9	9	8	نهاية اليوم 7	7	6	5	4	نهاية اليوم 3	3	2	1	العمر بالأيام	
48	48	48	39	39	39	28	28	28	28	17	17	17	13	13	13	13	13	8	8	8	الطول (مم)
0	0	9	0	0	11	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0	x	النمو (مم)
		5			4			3			2					1					الإنسلاخات

الوثيقة 12 : جدول القياسات للطول عند الجرادة



الوثيقة 13

- 1 - حلل الرسم البياني (الوثيقة 13). ماذا تستنتج بخصوص نمو الجرادة؟
- 2 - فسر تقطع النمو في الطول عند يرقة الجرادة استناداً إلى الوثيقتين 11 و 14.
- 3 - استنتج بعض خصائص النمو عند الحشرات.

الوثيقة 14 : عملية الإنسلاخ

الأخيرة عند الجرادة

الخلاصة

يبرز المنحني البياني أن النمو في الطول عند الأرنب و عند بعض الحيوانات الأخرى متواصل و لا يتوقف إلا عند البلوغ. يعتبر إنتاج اللحم حصيلة هذا النمو الذي يتسارع من الولادة إلى سن البلوغ.

المنحني البياني للنمو عند الجرادة و عند بقية الحشرات يذكرنا بشكل الدرج لذلك فهو يعرف بالمدرج البياني. و يشتمل هذا المدرج على نوعين من الخطوط هما:

- الخطوط الأفقية و تمثل الفترات التي ينعدم فيها النمو الطولي .
- الخطوط العمودية و تمثل الفترات التي يزداد فيها طول الحيوان فجأة.

لهذا نقول أن النمو الطولي عند يرقة الجرادة غير متواصل و هذا التقطع في النمو سببه الدرع الصلب المحيط بجسم الجرادة و غير القابل للتمدد. و لكي يحدث النمو طويلا تتخلص اليرقة من درعها و تسمى هذه العملية بالإنسلاخ .



تمرين عدد 1:


الهدف : اختبار القدرة على التطبيق

مكّنت متابعة نمو قط صغير بداية من اليوم العاشر من عمره (بتسجيل الوزن و الطول كل عشرة أيام) من الحصول على المعطيات المدونة بالجدول التالي :

العمر(بالأيام)	10	20	30	40	50	60	70
طول الجسم (صم)	24	28	29	31	32.5	33	35
طول الذيل (صم)	7	8	10	11	14	16	17
طول القدم (صم)	4.5	5	6	6.5	7.5	8	8.5
طول اليد والساعد (صم)	7	7.5	8	9	10	11	13
طول صيوان الأذن (صم)	1.5	3	3.2	3.7	4.5	4.8	5
وزن الجسم (غ)	205	375	525	600	775	950	1125

- 1 - ارسم المنحنيين البيانيين لنمو جسم القط في الطول و الوزن على ورقة مليمتريّة.
- 2 - ابحث عن قيمة النمو في الطول و الوزن عند القط كل عشرة أيام و سجل النتائج المتحصل عليها في جدول مواز للجدول السابق.
- 3 - استنتج المعدل الشهري للنمو في الطول و الوزن عند هذا الحيوان.
- 4 - هل يتم النمو بنفس السرعة في مختلف أعضاء الجسم؟ علل جوابك.

تمرين عدد 2 :



- يمثل المنحني الملوّن بالأخضر النمو الطولي لجسم يرقة الفراشة
 - يمثل المدرج البياني بالبرتقالي النمو العرضي لرأس يرقة الفراشة
- 1 - قارن النمو العرضي في الرأس بالنمو الطولي الإجمالي في الجسم بالاعتماد على المنحني والمدرج البيانيين .
 - 2 - ماذا تستنتج ؟

الإصلاح

تمرين عدد 2 :

- 1 - النمو الطولي لجسم يرقة الفراشة متواصل وتصاعدي من البداية إلى اليوم 18 ثم متواصل وتنازلي من اليوم 18 إلى اليوم 25 .
بينما النمو العرضي لرأس يرقة الفراشة متقطع . الخطوط الأفقية تمثل فترات انعدام النمو والخطوط العمودية تمثل الفترات التي يزداد فيها طول عرض الرأس فجأة .
- 2- نستنتج أن النمو الطولي في يرقة الفراشة متواصل ويتوقف بعد التحول من طور اليرقة إلى طور الحورية التي بدورها ستتحوّل إلى فراشة بالغة .
بينما النمو العرضي في رأس يرقة الفراشة متقطع وهذا التقطع سببه انسلخات الدرع الصلب المحيط برأس يرقة الفراشة .

تمرين عدد 3 :

الهدف : اختبار القدرة على التطبيق

تمت متابعة النمو عند جراد البحر وهو من القشريات البحرية و ذلك بقياس طوله فحصلنا على النتائج التالية :

355	354	353	352	223	222	221	220	112	111	110	59	58	57	30	29	28	9	8	0	العمر(باليوم)
53	53	49	43	43	42	38	35	35	33	28	28	26	23	23	21	19	19	16	16	الطول (بالمم)

كما تمثل الوثيقة الموالية مراحل النمو عندها الحيوان :



مراحل النمو عند جراد البحر

- 1 - ارسم المنحني البياني للنمو في الطول عند هذا الحيوان
- 2 - قارنه بالمنحني البياني للنمو عند القط
- 3 - حلل المنحني المتحصل عليه و استنتج طريقة النمو عند القشريات
- 4 - ابحث عن عدد الإنسلخات عند هذا الحيوان

للحصول على أوفر إنتاج حيواني يعمل الفلاح على توفير العلف المناسب و بالكمية اللازمة عند قيامه بتربية بعض الحيوانات كالأبقار (الوثيقة 15) لتجنب مظاهر سوء التغذية عندها (الوثيقة 16) .

كيف تؤثر التغذية على نمو الحيوان و بالتالي على إنتاجه ؟



الوثيقة 15 : تقديم العلف للأبقار



الوثيقة 16 : بقرة في حالة هزال

1 - تأثير التغذية على النمو :**النشاط الأول : متابعة النمو عند الأرنب**

قبل الدرس بثمانية أسابيع قام تلاميذ بمتابعة نمو مجموعة من الخرناق عمرها في بداية التجربة 35 يوما وذلك بتربيتها في أقفاص داخل المخبر وقد وقع تقسيم هذه الخرناق إلى ثلاث مجموعات حسب نوعية الغذاء كما يبينه الجدول التالي :

الوزن في نهاية التجربة (غ)	الوزن في بداية التجربة (غ)	نسبة البروتينات في الوجبة اليومية (غ)	المجموعة (أ)
1951	405	19.1	المجموعة (أ)
1906	405	18.2	المجموعة (ب)
1874	405	18	المجموعة (ج)

- 1 - استنتج تأثير نوعية التغذية على نمو الحيوان .
- 2 - ابحث عن المعدل اليومي للنمو في الوزن عند كل مجموعة و ذلك برسم جدول مواز للجدول السابق بعد نسخه على كراسك .

النشاط الثاني: إنجاز رسوم بيانية وتحليلها

- 1 - باعتماد الجدول المتحصل عليه في النشاط الأول أنجز رسوما بيانية للنمو في الوزن لكل مجموعة من الخرناق أ و ب و ج .
- 2 - حلل الرسوم البيانية المتحصل عليها لإبراز خصائص النمو لكل مجموعة.

2 - تأثير العوامل الصحية على النمو :**النشاط الثالث : تحديد بعض العوامل الصحية الملائمة لنمو حيوان**

تمثل الوثائق التالية بعض الطرق الوقائية التي يتبعها الإنسان لحماية الدجاج من الأمراض التي تهدده و ذلك من خلال تلقيح الفراخ (الوثيقة 17) أو إعطاء جرعة من الأدوية للعلاج الوقائي عند الدجاج (الوثيقة 18) كما تبرز الوثيقة 19 تساقط الريش عند الدجاج و هو مظهر يدل على سوء التغذية .



الوثيقة 18 : تقديم الدواء للدجاج



الوثيقة 17 : تلقيح الفرخ



الوثيقة 19 : دجاجة مصابة بسوء التغذية

- 1 - استخراج من خلال هذه الوثائق بعض الطرق المستعملة لوقاية الدجاج من الأمراض التي تهدده .
- 2 - أجز بحثا عبر شبكة الإنترنت للتعرف على أهم الأمراض التي تهدد الدجاج و التلقيح الموجودة للوقاية من هذه الأمراض .

الخلاصة

يتأثر نمو الحيوان و بالتالي إنتاجه (حليب ، صوف ، لحم ، بيض...) بالوسط الذي يعيش فيه (التغذية ، الظروف الصحية ...) ذلك أن سوء التغذية عند الحيوان يبطئ نموه. إن سرعة النمو مرتبطة بكمية الغذاء و نوعيته و هو ناتج عن بناء المادة الحية انطلاقا من الغذاء.

إن دور الباحثين والعاملين في مجال إنتاج الغذاء الحيواني هو العمل على توفير أغذية ملائمة و صحيّة للحيوانات تمكّن من النموّ والإنتاجيّة الجيدة .




تمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على التطبيق

قام فلاح بتربية سلالتين من الأرانب أ و ب : • السلالة أ بيضاء neo zelande
• السلالة ب بيضاء Termonde

وقد قام بدراسة تأثير نسبة البروتينات في الوجبة على نمو السلالتين بالغرام في اليوم فتحصل على الرسم التالي :


- 1 - استنتج تأثير نسبة البروتينات على نمو السلالتين
- 2 - ابحث عن الكمية المثلى من البروتينات التي يجب على الفلاح توفيرها لضمان نمو عادي عند الحيوان .



تمرين عدد 2 :

الهدف : اختبار القدرة على التحليل والمقارنة

قام مربّي طيور بتربية مجموعتين من نفس سلالة السمّان. قدم للمجموعة الأولى غذاء كامل وللمجموعة الثانية غذاء ناقص ثمّ راقب النموّ في الوزن عند المجموعتين فتحصل على النتائج المبينة في المنحنيين البيانيين التاليين



- 1 - قارن النمو عند المجموعتين من طيور السمّان بالاعتماد على تحليل المنحنيين البيانيين.
- 2 - استنتج تأثير التغذية في تحسين النمو في الوزن عند طيور السمّان.

العلاقات الغذائية و التوازن البيئي

توجد علاقات غذائية بين الكائنات الحيّة (مثلما تبينه الوثائق 1 و2 و3) والإنسان مندرج في هذه العلاقات وقد يؤثر سلبا على المحيط بتلويثه (الوثيقة 4) وباستغلاله المفرط للغطاء النباتي (الوثيقة 5) وللثروة الحيوانية (الوثيقة 6) .

كيف يمكننا استغلال الموارد الحيّة بالمحيط مع المحافظة على توازنه في نطاق التنمية المستدامة ؟



الوثيقة 2



الوثيقة 1



الوثيقة 4



الوثيقة 3



الوثيقة 6



الوثيقة 5

فهرس الجزء الثالث

الدرس 1 : العلاقات الغذائية بين الكائنات الحيّة
الدرس 2 : التوازن البيئي

مكتسباتي السابقة :

درست بالسنة 7 أساسي:

- مكونات الوسط البيئي .
- العلاقات بين مكونات الوسط البيئي .
- تنوع الأوساط البيئية .

تبينت اختلاف خصائص المكونات الحية واللاحيية وتكيف الكائنات مع محيطها وذلك بإقامة علاقات عديدة تمكنها من العيش والتكاثر . لكل كائن دوره في الوسط البيئي .

توجد علاقات عديدة بين الكائنات الحيّة داخل الوسط البيئي و من بينها العلاقات الغذائية
(الوثيقة 7)

كيف تترابط الكائنات الحيّة فيما بينها غذائيًا داخل الوسط البيئي؟
كيف تساهم العلاقات الغذائية في المحافظة على التوازن البيئي؟



الوثيقة 7

1 - تنظيم العلاقات الغذائية بالوسط البيئي
النشاط الأول : تحديد مفهوم السلسلة الغذائية

1 - بناء سلاسل غذائية داخل وسط غابي :
ندعوك لاستغلال كل من الوثيقة 8 والوثيقة 9 بخصوص العلاقات الغذائية بالوسط الغابي.



الوثيقة 8

الكائنات الحيّة	الغذاء المستهلك
الحيوانات	خنفس البلوط
	جعل
	سنجاب
	حمام
	نقّار
	سمّور
	نحلة
	دخيلة
	أيل
	فأر الغابة
النباتات	شجرة البلوط
	العشب
الكائنات الدقيقة	الجراثيم
	الماء والأملاح المعدنية
	بقايا الكائنات الحيّة
	يرقة الجعل
	العشب
	الأوراق و البذور
	الحشرات و الثمار
	رحيق الأزهار
	السنجاب و الطيور
	يرقات الحشرات
	الثمار و البذور

الوثيقة 9

- 1 - تعرّف إلى الأنظمة الغذائية للحيوانات الواردة في الجدول بالوثيقة 9 .
 - 2 - بالاعتماد على الوثيقة عدد 8 وبعد نسخها على كراسك أربط بسهام كلّ حيوان بغذائه المبين بالوثيقة 9 لبناء سلاسل غذائيّة .
 - 3 - ماذا تمثّل النباتات الخضراء بالنسبة لبقية الكائنات الحيّة؟
 - 4 - ماهو دور الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة ؟
 - 5 - ضع الرموز التالية على عناصر كلّ سلسلة غذائيّة .
- P : كائنات منتجة .
 - C₁: حيوانات عاشبة تتغذى على النباتات .
 - C₂ : حيوانات لاحمة تتغذى على الحيوانات العاشبة .
 - D : كائنات دقيقة .

2 - بناء سلاسل غذائية داخل وسط بحري :

ندعوك لاستغلال كل من الوثيقة 10 والوثيقة 11 الخاصّة بالعلاقات الغذائية داخل الوسط البحري.



الوثيقة 10

الغذاء المستهلك	الكائنات الحيّة	
الأنشوفة و الرنكة الطحالب والعوالق الحيوانية العوالق النباتية العوالق النباتية الرنكة والعوالق الحيوانية الرنكة والأنشوفة العوالق الحيوانية الأنشوفة الأسكمبري	طائر الغاق البوري العوالق الحيوانية الرنكة الكالمار كالب البحر الأنشوفة الأسكمبري التن	الحيوانات
الماء والأملاح المعدنية	العوالق النباتية الطحالب	النباتات
بقايا الكائنات الحيّة	الجرائيم	الكائنات الدقيقة

الوثيقة 11

شاهد الوثيقة 10 التي تبين كائنات حيّة داخل وسط بحري.

- 1 - تعرّف إلى الأنظمة الغذائية للحيوانات الواردة في الجدول بالوثيقة 11.
- 2 - بالاعتماد على الوثيقة 10 وبعد نسخها على كراسك اربط كل حيوان بغذائه المبين بالوثيقة 11 لبناء سلاسل غذائية.
- 3 - ماذا تمثّل الطحالب و العوالق النباتية بالنسبة إلى بقية الكائنات الحيّة ؟
- 4 - ماهو دور الكائنات الدقيقة الموجودة في قاع البحر ؟
- 5 - لماذا يتناقص تواجد العوالق النباتية كلما غصنا في قاع البحر؟
- 6 - ضع الرّموز المناسبة (أنظر الصفحة السابقة)

النشاط الثاني : تحديد مفهوم الشبكة الغذائية

أ- بناء شبكة غذائية داخل وسط غابي

ترتبط الكائنات الحيّة داخل الوسط البيئي الغابي المبيّن بالوثيقة 12 فيما بينها غذائيًا وتكوّن سلاسل غذائية عديدة قد يشترك بعضها في كائن واحد أو أكثر .




الوثيقة 12 : سلاسل غذائية داخل وسط غابي

1 - من منتج (p) إلى مستهلك درجة أولى (C1)
2 - من مستهلك درجة أولى (C1) إلى مستهلك درجة ثانية (C2)
3 - من مستهلك درجة ثانية (C2) إلى مستهلك درجة ثالثة (C3)

توضيح البيانات المستعملة بالوثيقة 12

- 1 - أبّن شبكات غذائية على كراسك انطلاقًا من السلاسل الغذائية المبينة بالوثيقة 12.
- 2 - بيّن مصير السلاسل الغذائية إذا أتلّفت النباتات الخضراء .
- 3 - استنتج أهميّة العلاقات الغذائية في المحافظة على التوازن البيئي في الأوساط البرية .


ب : بناء شبكة غذائيّة داخل وسط بحري



الوثيقة 13 : سلاسل غذائيّة داخل وسط بحري

ترتبط الكائنات الحيّة داخل الوسط البيئي البحري المبيّن في الوثيقة 13 فيما بينها غذائيا وتكوّن سلاسل غذائيّة عديدة قد يشترك بعضها في كائن واحد أو أكثر .

- 1 - أبّن شبكات غذائيّة انطلاقا من السلاسل الغذائيّة المبيّنة بالوثيقة 8
- 2 - ماذا تكوّن مجموعات السلاسل الغذائيّة ؟
- 3 - ماهو مصير السلاسل الغذائيّة إذا أتلقت العوالق النباتيّة والطحالب ؟
- 4 - شاهد الوثيقة 14 ثم بيّن تأثير الصيد المفرط على التوازن البيئي .
- 5 - استنتج أهميّة العلاقات الغذائيّة في المحافظة على التوازن البيئي في الأوساط المائيّة؟



الوثيقة 14

2 - العلاقات الغذائية والتوازن البيئي

النشاط الثالث : تبين أهمية العلاقات الغذائية في المحافظة على التوازن البيئي

اعتاد سكان قرية من إحدى الغابات تكليف أطفالهم بالذهاب إلى الغابة المجاورة قصد قطع الأغصان وجمعها لاستعمالها كحطب لغاية الطبخ والتدفئة وإنتاج الفحم. ولحماية الأطفال من الحيوانات السامة كالزواحف والعقارب قرّر الأهالي اصطيادها والقضاء عليها . لتحسيس أهالي القرية من مغبّة هذا التصرف المؤدّي إلى القضاء على هذه الحيوانات ولنصحهم بحسن استغلال الموارد الغابيّة دون الإضرار بالوسط نقتراح عليك الوثائق التالية :

الوثيقة رقم 15 : دورة حياة شجرة السرو

يبلغ طول شجرة السرو 15 م وسمك جذعها 50 سم وهي تتكاثر جنسيا فقط كما أنّها تعمّر 500 سنة .

الوثيقة رقم 16 : النظام الغذائي للأفاعي والعقارب

تتغذى الأفاعي على الجرذان وصغار الأرناب التي تتغذى بدورها على جذور النباتات وخاصّة المغروسة منها . كما أنّ الأفاعي تتغذى على الضفادع (الوثيقة 17) التي تتغذى بدورها على الحشرات (ذباب ، بعوض ، جراد (الوثيقة 18) ...). أمّا العقارب فإنّها تتغذى على الحشرات (ذباب ، بعوض ...).




الوثيقة 18




الوثيقة 17

- 1 - ماهي الانعكاسات النّاتجة عن قطع الأشجار؟
- 2 - ماهي الانعكاسات النّاتجة عن القضاء على الأفاعي والعقارب ؟
- 3 - حرر فقرة وجيزة تبين فيها أهمية العلاقات الغذائية في المحافظة على التوازن البيئي .

- **المنتجات** : كائنات تنتج المادة العضوية بعملية التركيب الضوئي وتمثل في الطحالب والعوالق النباتية بالنسبة إلى الأوساط المائية والنباتات الخضراء في الأوساط البرية وهذه الكائنات النباتية تسمى بالكائنات ذاتية التغذية .
- **المستهلكات** : كائنات غير قادرة على إنتاج المادة العضوية بعملية التركيب الضوئي. نبيز أنواعا من المستهلكات وذلك حسب مستواها الغذائي :
 - * المستهلكات درجة أولى : الحيوانات العاشبة
 - * المستهلكات درجة ثانية : الحيوانات اللّاحمة التي تتغذى على الحيوانات العاشبة
 - * المستهلكات درجة ثالثة : الحيوانات اللّاحمة التي تتغذى على الحيوانات اللّاحمة
- * **المفكّكات**: تكتمل السلسلة الغذائية بتفكيك الكائنات الميتة النباتية والحيوانية بواسطة الجراثيم يرمز للكائنات المفكّكة بحرف D .




تترابط السلاسل الغذائية في الوسط البيئي لتكوّن شبكة غذائية



إنّ فقدان أيّ حلقة من حلقات السلسلة أو الشبكة الغذائية يسبّب اختلال التوازن البيئي وعرقلة التنمية المستدامة .

التمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على التذكر



تمثل الوثيقة التالية سلاسل غذائية داخل بركة

- 1 - أسند الرموز المناسبة للكائنات المنتجة والمستهلكة والمفككة .
- 2 - ارسم كل السلاسل الغذائية التي تتدخل فيها سمكة البرعان .
- 3 - عرّف الشبكة الغذائية .

التمرين عدد 2 :

الهدف : اختبار القدرة على التذكر


اربط بسهم بين كل كلمة و التعريف المناسب لها

الكلمات المعرّفة	التعريف
أ - مستهلك	1 - مجموع العلاقات داخل الوسط البيئي
ب - شبكة غذائية	2 - حلقة من السلسلة الغذائية تتغذى بالمادة العضوية
ج - منتج	3 - تنابع كائنات حية منها أكل ومنها مأكول
د - سلسلة غذائية	4 - أول حلقة للسلسلة الغذائية , تصنع المادة العضوية انطلاقا من المادة المعدنية

التمرين عدد 3 :

الهدف : اختبار القدرة على الفهم

حشرات الأرقعة تتغذى على أعضاء النباتات المختلفة وتمتص نسغها (الوثيقة 19) فهي تمثّل آفة زراعيّة كبرى لأنّها تتكاثر بسرعة فائقة . إنّ حشرة واحدة تزن 1 ملّيغرام تعطي في موسم واحد عددا من الصغار تزن 106 822 □ طن إذا توفّر لها الغذاء الكافي لكن ذلك لا يحصل لوجود حشرات الدّعسوقة المفترسة (الوثيقة 20) والطيور وحيوانات مفترسة أخرى وبذلك تمكّن المفترسات من حماية المحاصيل الزراعيّة بافتراس حشرات الأرقعة .



الوثيقة 20



الوثيقة 19

بالاعتماد على النص والوثيقتين 19 و20 بيّن :

- 1 - تأثير الافتراس على الحدّ من الفرائس .
- 2 - أهميّة المفترس في المحافظة على التوازن في الوسط البيئي .

التمرين عدد 4 :

الهدف : اختبار القدرة على التحليل

بيّن الجدول التالي عدد الأرناب والنّعالب داخل غابة على مدار 12 سنة

السنة	1965	1966	1967	1968	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
عدد الأرناب	4000	4500	4900	5800	6000	3200	3950	4700	3050	3950	4900	6000
عدد النّعالب	980	1450	1500	1900	2400	2500	2050	1500	1500	1900	2500	3100

- 1 - ارسم على ورقة مليمترية المنحني البياني لعدد الأرناب عبر السنين .
- 2 - ارسم على نفس الورقة المنحني البياني لعدد النّعالب .
- 3 - حلل تغيّر عدد الحيوانين عبر السنين .

بقرة في المرعى

العلاقة بين البقرة والمرعى وثيقة جدًا ويتأثران ببعضهما البعض فالبقرة



الوثيقة 21 : بقرة في المرعى

لايمكنها العيش بدون مرعى والمرعى

لايزدهر بدون البقرة .

تتغذى البقرة بعشب المرعى (الوثيقة 21)

والمرعى يستفيد بعديد العناصر الضرورية

من البقرة لاستدامة دورة حياته .

تتغذى البقرة وتأخذ أكسجين الهواء

الجوي وتطرح ثاني أكسيد الكربون

الذي ينتشر في الهواء الجوي. لو بقي

هذا الغاز على حاله لتسبب في تضرر العديد

من الحيوانات إذا النبات في المرعى يمتص هذا الغاز ويستعمله في عملية التركيب الضوئي

ويطرح الأكسجين الذي تستهلكه البقرة أثناء تنفسها.

يلاحظ كذلك أنّ البقرة تطرح العديد من الفضلات تتنافس عليها العديد من الكائنات الحيّة.

فالعديد من من أنواع الحشرات تتجمع حول البقرة وتجمع إفرازات عينيها (الوثيقة 22) ومخاط

أنفها وتمتص الدم من جلدها كما تضع بيضها والحشرات بدورها غذاء لأنواع عديدة من الطيور

والزواحف .

توجد في تربة المرعى العديد من الجراثيم و الكائنات الدقيقة تفكّك فضلات البقرة وتبسّطها

إلى عناصر تأخذ منها حاجاتها ويتوزع الباقي في التربة تستفيد بها جذور النباتات بعملية

الامتصاص .

وأخيرا إذا ماتت البقرة تتمدد جثتها على العشب فتستهلكها الحيوانات اللّاحمة والبقية من الجثة

تفكّك بالجراثيم وهكذا تتواصل الدورات الحياتية ممّا يحافظ على استدامتها في المرعى.



الوثيقة 22 : حشرات تتجمع حول عين البقرة لامتصاص الإفرازات

(المؤلف : ريني تيفينين)

يتميز كلّ وسط بيئي بمكوّنات حيّة (حيوانات و نباتات وكائنات دقيقة) ومكوّنات لاحيّة (التربة بالنّسبة للأوساط البريّة والماء بالنّسبة للأوساط المائيّة) والعوامل المناخيّة . ترتبط مكوّنات الوسط البيئي فيما بينها بعلاقات تفاعل مستمرة وأيّ تغيير أو فقدان لأحد هذه المكوّنات يسبّب إخلالاً لهذه العلاقات ويهدّد توازن الوسط البيئي : التلوّث (الوثيقة 23) وجود أنواع نباتيّة وحيوانيّة مهدّدة بالانقراض (الوثيقة 24) يتدخّل الإنسان للمحافظة على الأوساط البيئيّة بطرق مختلفة كتثبيت الكثبان الرّمليّة (الوثيقة 25) .

كيف يمكن للإنسان أن يتدخّل للمحافظة على توازن هذه الأوساط البيئيّة ؟

عدد الأنواع المهدّدة بالانقراض	العدد الإجمالي	
364	2924	النباتات البريّة
22	649	نباتات المناطق الرطبة والبحرية
386	3573	مجموع الأنواع النباتيّة
36	758	الحيوانات البريّة
14	1486	حيوانات المناطق الرطبة والبحرية
50	2244	مجموع الأنواع الحيوانيّة



الوثيقة 23 : تلوّث مجرى وادي

الوثيقة 24 : جدول توزيع الأنواع

النباتيّة والحيوانيّة بالبلاد التونسيّة



الوثيقة 25 : تثبيت الكثبان الرّمليّة

سنبدأ بدراسة مظاهر اختلال التوازن البيئي

1 - مظاهر اختلال التوازن البيئي

تتميز البلاد التونسية بتنوع مشاهداتها الطبيعية الناتج أساساً عن تنوع المناخ الذي يتسم بالرطوبة في الشمال وبشدة الجفاف في الجنوب . لذا توجد عدة منظومات بيئية منها:

النشاط الأول : دراسة تضرر المنظومات البيئية الساحلية

تمتد السواحل التونسية على طول 1300 كلم تتشكل في مشاهد متنوعة (سواحل صخرية وسواحل رملية و جبال صخرية ...) .


1 - استنادا إلى الوثائق 26 و 27 و 28 و 29 وإلى مكتسباتك السابقة حدد مظاهر تضرر السواحل وأسبابها.

2 - استنتج تأثير هذا التضرر على التوازن البيئي بالسواحل.

3 - وضح أهمية المنظومات البيئية الساحلية.

المفتاح

- 1 الموانئ
- 2 الإفرازات الحضرية
- 3 التلوث البشري
- 4 الأودية ذات المصب الخارجي
- 5 الإفرازات الصناعية
- 6 عمليات إستغلال البترول
- 7 حوادث غرق السفن
- 8 إفرازات البواخر في البحر



الوثيقة 26 : المصادر المختلفة لتلوث البحر



الإسم العلمي: *posidonia oceanica*

الإسم باللغة الفرنسية: *la posidonia*

الوضع الحالي: نوع نباتي يعيش في البحر المتوسط ومحيطي

التهديدات: تعتبر معشبات البوزيديا موروثا لألاف السنين وهو حالياً مهدد بسبب الأنشطة البشرية (الصيد بالكركاره، الإفرازات الصناعية...)

الوثيقة 27 : معشب الضريع (البوزيديا) مصدر للحياة بالبحر الأبيض المتوسط



الوثيقة 29 : البناء الفوضوي
على السواحل



الوثيقة 28 :
الصيد المفرط بالكركرة

النشاط الثاني : تبين تضرر المنظومات البيئية الغابية :

- 1 - استنادا إلى الوثائق 30 و31 و32 و33 و34 حدّد مظاهر تضرر الأوساط الغابية وأسبابها.
- 2 - استنتج تأثير ذلك على التوازن البيئي بالغابات.
- 3 - اذكر أهمية هذه المنظومات البيئية الغابية للإنسان.



الوثيقة 31 : قطع خشب غابة



الوثيقة 30 : حريق في غابة

التوازن البيئي



الوثيقة 32 : قطع من الماعز في الغابة



الوثيقة 33 : الصيد المفرط للخنزير بغابة عين دراهم



الوثيقة 34 : استعمال أراضي غابية للإنسان

النشاط الثالث : تبين بعض مظاهر تضرر المنظومات البيئية الصحراوية :

- 1 - استنادا إلى الوثائق 35 و36 و37 و38 و39 حدّد بعض مظاهر تضرر الأوساط الصحراوية وأسبابها.
- 2 - استنتج تأثير ذلك على التوازن البيئي.
- 3 - أذكر أهمية هذه المنظومات البيئية الصحراوية للإنسان.



الوثيقة 35 : الزحف العمراني على الواحات الوثيقة 36 : زحف الرمال على الواحات



الوثيقة 38 : صيد الغزال

الوثيقة 37 : تأثير الجفاف على الحيوانات



الغزال

الاسم العلمي : *gazella leptoceros*

الوضع الحالي: ينتمي للقائمة الحمراء التي أعدها الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة سنة 2001 كنوع في خطر، وهو كذلك من الحيوانات التي تقرّر حمايتها في اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية منذ سنة 1986

الوثيقة 39 : الغزال مهدد بالانقراض

2 - كيفة المحافظة على التوازن البيئي

النشاط الرابع : تين كيفة المحافظة على الثروة الحيوانية

اطلع على الوثيقة 40 واستعن بها في توضيح :

— أهمية ترشيد الصيد البري

— أهمية ترشيد الصيد البحري

الوثيقة 40 : نص بخصوص الصيد البري والبحري

أ— الصيد البري : قانون عدد 13 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بتنقيح مجلة الغابات وإتمامها.

الفصل 165 (جديد) :

يهدف الصيد إلى تحقيق التوازن بين وجود الحيوانات البرية والكساء النباتي والأنشطة البشرية. ولهذا الغرض، يتعين على الصيادين ممارسة هذا النشاط برشد ومسؤولية والمحافظة على توازن المنظومات البيئية واستدامتها. والصيد هو البحث والمطاردة والرمية والقبض على الحيوانات التي تعيش طليقة وتدعى المصيد.

و وسائل الصيد المسموح باستعمالها هي بنادق الصيد والطيور الجوارح والكلاب المروضة للقبض على المصيد.

ومناطق الصيد هي ميادين تهيأ خصيصا بهدف ممارسة الصيد طبقا لكراس شروط يضبط خاصة مساحاتها وأنواع المصيد المستوطنة. بها ومختلف أشغال التهيئة الواجب القيام بها. ويعتبر صيدا كذلك، التقاط مناظر للحيوانات البرية المحمية في وسطها الطبيعي بواسطة الآلات الفوتوغرافية والسينمائية.

وينظم هذا الصيد بقرار من الوزير المكلف بالغابات.

الفصل 167 (جديد) :

تضبط شروط تعاطي الصيد وأنواع المصيد وتواريخ فتح وغلق موسم صيدها والمحميات التي يحجر تعاطي الصيد فيها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للصيد والمحافظة على المصيد. وينشر هذا القرار خمسة عشر يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد.

ويحجر صيد الحيوانات غير المنصوص عليها بهذا القرار والقبض عليها ومسكها والإجار فيها وتصديرها وتوريدها إلا بترخيص استثنائي من الوزير المكلف بالغابات لفائدة البحث العلمي والصحة الحيوانية ولإنجاز حدائق حيوانات عمومية ومراكز لتربية الحيوانات البرية طبقا لأحكام الفصل 211 من هذه المجلة أو في نطاق التبادل مع المؤسسات ذات الصلة.

الفصل 192 (جديد) :

يحجز ما يلي:

- * وسائل النقل بمختلف أنواعها المستعملة للمطاردة أو للصيد.
- * الشباك والحبال والشراك والفخاخ والأغاري والدبابيس والمقاليع وكل الأدوات المستعملة للمطاردة أو للصيد أو المتروكة بعد استعمالها أو التي عثر عليها بحوزة المخالف خارج محل سكنه.
- * الأسلحة المتخلى عنها والأسلحة غير المرخص في حملها.

الفصل 209 (جديد) :

قصد صيانة التراث البيولوجي الوطني والمحافظة على النباتات والحيوانات البرية المحمية. يحجر:

- صيد الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض وإتلافها والقبض عليها ورفعها ونقلها وتخزينها وهبتها وعرضها للبيع وبيعها أو شراؤها وكذلك بالنسبة إلى بيضها وأعشاشها أو حضاناتها وصغارها إلا بترخيص استثنائي من الوزير المكلف بالغابات.
 - إتلاف المواقع التي تمكن من دراسة تاريخ الأرض والكائنات الحية .
 - إتلاف أنواع النباتات النادرة والمهددة بالانقراض أو ثمارها كاملة أو مجزئة وقطعها وبتريها وتقليعها وجنيها ورفعها وشحنها ونقلها وهبتها وعرضها للبيع وشراؤها.
- ب - الصيد البحري:

تمكن قطاع الصيد البحري في تونس بفضل العديد من الإجراءات التي أقرت لفائدته وشملت كافة الجوانب التنموية والحماية الكفيلة بإرساء دعائم الاستغلال المستديم للثروات السمكية من تحقيق حجم إنتاج بلغ 108 طن سنة 2005 كما يوفر هذا القطاع ما لا يقل عن 45 ألف موطن شغل مباشر و15 ألف موطن شغل غير مباشر.

إنّ المحافظة على الثروة السمكية من الاستنزاف الذي بات يهددها وضمان ديمومتها للأجيال القادمة يبقى رهين التوفيق في التصدي للسلوكات الضارة بهذه الثروة وتوجيه المهنيين نحو حسن الاستغلال

والتصرف الرشيد في الموارد السمكية باستعمال الطرق والتقنيات السليمة . ولتأمين أفضل السبل للمحافظة على توازنات الثروة السمكية وبلورة خطط عملية لمزيد ترشيد استغلال هذه الثروة تمّ:

- وضع الخطط المحكمة لاستغلال الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد في مختلف المناطق
- إرساء منظومة لمراقبة المراكب بحرا بواسطة الأقمار الاصطناعية .
- اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الصيد العشوائي .
- الشروع في إنجاز مشروع لحماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس وفي تنفيذ مشروع حول الإدارة المستدامة للموارد السمكية الساحلية بتونس .



الصيد البحري المنظم يحمي الثروات السمكية

النشاط الخامس : تبين كيفية المحافظة على الغطاء النباتي

استنادا إلى الوثيقة 41 وإلى مكتسباتك السابقة وضح أهمية المحافظة على الغطاء النباتي بالغابات وبالمراعي

الوثيقة 41 : نص بخصوص الغابات والمراعي

أ - الغابات : قامت تونس بمجهودات كبيرة للترفيح في الغطاء النباتي حيث تطوّرت المساحة الجمليّة للغابات من حوالي 400 ألف هكتار فقط عند الاستقلال إلى أكثر من مليون حاليا (حوالي 1192 ألف هكتار سنة 2003) وقد ارتفعت نسبة الغطاء النباتي من 4% سنة 1956 إلى 11.94 % سنة 2003 دون اعتبار الصحاري والشطوط .

- ففي الفترة التي تتراوح بين سنتي 1993 و2003 تمّ تشجير مساحة تقارب 264 ألف هكتار. في نفس السياق ولضمان ديمومة الغابات وحسن التصرف في الموارد الغابيّة ، يتمّ إعداد دراسات التهيئة الغابيّة المندمجة والتشاركيّة ، والتي تعتبر مرجعا فنيا يضبط سنويا وعلى امتداد 20 سنة تقريبا كلّ الأشغال الواجب القيام بها على مستوى كل غابة .

- فبالنسبة لغابات الإنتاج يتم برمجة الاستغلال حسب قواعد فنية وبرنامج سنوي يهدف إلى تحقيق التجدد الطبيعي والاصطناعي للأشجار مع إنتاج سنوي منتظم .

- أمّا بالنسبة لغابات الحماية التي توجد بمناطق ذات مناخ جاف وتضاريس منكسرة وتتميّز بغطاء نباتي قليل الكثافة. يتمّ التدخل فيها خاصة بأشغال التشجير والتجديد الطبيعي لكي تلعب دورها الأساسي المتمثل في حماية الأراضي الفلاحيّة والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية

- أمّا الغابات الطبيعية أوالمحدثة والتي تتمتع بمظهر جمالي وموقع بيئي وجغرافي متميز فيتمّ تهيئتها في إطار غابات النزهة وذلك بتنوع الغراسات وإجاز مسالك بيئية ورياضية وتهيئة مساحات الترفيه والراحة .
- وتتنج أمثلة التهيئة المندمجة والتشاركية الحديثة إلى تشريك متساكني الغابات في إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة التي تعطي قيمة كبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الغابية كمنطقة عين دراهم.



غابة عين دراهم

ب - المراعي :

تفاديا لتدهور مردودية المراعي واختلال التوازن البيئي في المناطق الرعوية . عملت وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية على تنفيذ مشاريع تحسين وتهيئة المراعي ضمن مختلف المخططات التنموية والخطة الوطنية التي تعتنى بهذا القطاع . ويتمثل البرنامج المستقبلي لتحسين وتهيئة المراعي في الخطة الوطنية لتنمية وترشيد استغلال المراعي خلال 2002 – 2011 في الجدول التالي.

عناصر الخطة	إنجازات الخطة (2002_2003)	أهداف الخطة (2002_2011)
غراسة الشجيرات الرعوية(هك)	18098	210000
غراسة الهندي الأملس(هك)	16170	165000
التهيئة والاستزراع(هك)	26250	275000
المجموع	60468	650000

جدول الخطة الوطنية لتنمية المراعي**مراعي مهيأة للمحافظة على الغطاء النباتي**

النشاط السادس : تبيين كيفية المحافظة على الماء:

بالاعتماد على الوثيقة 42 فسّر كيف أنّ المحافظة على الموارد المائية لها علاقة بالتوازن البيئي.

الوثيقة 42 : نص بخصوص استغلال الموارد المائية

تتكوّن منشآت تعبئة الموارد المائية في موفى سنة 2003 بالخصوص من :
27 سدًا كبيرًا و 182 سدًا تليًا و 698 بحيرة جبلية و 3780 بئرًا عميقة و 130 ألف بئر سطحية (78 ألف منها مجهزة بمضخّات) و 86 عين طبيعية.
مكّنت هذه المنشآت من تعبئة 3.964 مليار متر مكعب أي قرابة 85% من الطاقة المائية

عدد المنشآت	منشآت التعبئة	النسبة المئوية %	الكميات بالمليار م ³ في السنة			الموارد المائية
			التي تمّ تعبئتها	الممكن	طاقة تعبئة المياه	
27 سدًا كبيرًا و 182 سدًا جبليًا و 698 بحيرة جبلية	سدود كبرى و سدود جبلية و بحيرات جبلية	82	2.05	2.5	2.7	المياه السطحية
3780 بئرًا عميقة و 86 نبعا طبيعيًا	آبار عميقة و ينابيع طبيعية	81	1.134	1.4	1.4	العميقة
130000 بئر سطحية منها 78000 بئرًا مجهزة بمضخّات	آبار سطحية	104.7	0.780	0.745	0.745	الجبلة العمق
		85.34	3.964	4.645	4.845	المجموع

جدول تعبئة المياه لسنة 2002 – 2003

إنّ استيعاب هذه الموارد المائية والتصرّف فيها يتم بالاعتماد على قاعدة معلوماتية تزود من معطيات شبكة قياس ومتابعة الموارد المائية وهي شبكات محطات قياس الأمطار وسيلان الأودية ومراقبة الطبقات المائية الجوفية الموزعة على جميع أنحاء الجمهورية وبالاعتماد كذلك على دراسات مختصة ودقيقة . وقد تمّ إنجاز هذه الدراسات في إطار مخططات مديريّة شاملة تهدف إلى التصرّف الرشيد في الموارد المائية لتسديد حاجيات الأجيال الحاضرة مع الحفاظ على الطلب المتوقع للأجيال القادمة .

للمحافظة على الموازنة بين كميات المياه المعبّئة والممكن استغلالها . تمّ اعتماد سياسة محكمة للتصرّف في الموارد المائية ترتكز من ناحية على ترشيد استغلال المياه في جميع الميادين وخاصة في الفلاحة التي تستهلك القسط الأوفر منها ومن ناحية أخرى على الزيادة من كميات المياه الممكن استغلالها وذلك بتعبئة المياه المتبقية من جملة الموارد الممكن تعبئتها وبالحد من ظاهرة التسرّب في السدود وباستغلال المياه غير التقليدية (خلية المياه واستغلال المياه المستعملة المعالجة في الري أوفي ميادين أخرى) إلى جانب حماية هذه الموارد من التلوّث.

النشاط السابع تبيّن كيفية المحافظة على التربة :

بالاعتماد على المعطيات الواردة بالوثيقة 43 فسّر علاقة المحافظة على التربة بالتوازن البيئي والتنمية المستدامة

الوثيقة 43 : نص بخصوص التربة**أ - المحافظة على التربة من الاجراف :**

للمحافظة على التربة والموارد الطبيعية بصفة عامة وضعت الدولة عدّة خطط وطنية نذكر منها الخطة الوطنية الأولى والثانية.

ملاحظة : تم وضع برنامج للمحافظة على المياه و التربة (2002 – 2011) بكلفة تقدّر بـ 780 مليون دينار.

المكونات	جملة الاجاز (2001- 1990)	جملة الاجاز(2002 - 2003)
تهيئة مصبات المياه(هك)	892.573	141.632
التعهد والصيانة(هك)	338.496	52.827
تهيئة اراضي الجبوب(هك)	70.494	740
بحيرات جبلية(وحدة)	580	57
منشآت لفرش المياه وتغذية المائدة المائية(معدة)	3.556	516

جدول اجازات الخطة الوطنية الأولى والثانية

كما شملت أشغال تهيئة المصبات تدخّلات متنوّعة تمثّلت خاصّة في الأشغال التالية :

نوعية الأشغال	جملة الاجاز (2002 – 2003) بالهكتار
تثبيت المنشآت	19700
غراسات رعوية	4660
غراسات مثمرة	10150
استزراع مراعي	425
تثبيت المجاري	1940
التشجير الغابي	540
المجموع	37415

جدول أشغال تهيئة المصبات**ب - المحافظة على التربة من التصحّر :**

اعتبر برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحّر أنّ كل المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية والفلاحية بالمناطق الجافة وشبه الجافة هي برامج ومشاريع لمقاومة التصحّر. وعلى هذا الأساس فإنّ الأطراف المتدخّلة من وزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات غير حكومية ومراكز الدراسات والبحوث تعتبر شريكة في تنفيذ برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحّر.


وشهدت سنة 2003 انطلاق عدّة مبادرات للمحافظة على الموارد الطبيعيّة ومقاومة التصحّر وتعلّق خاصّة بمشاريع التنمية الفلاحيّة المندمجة وشملت عديد الجهات والمنظومات البيئية المختلفة على غرار مشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي ومشروع تشجير الجبال المحيطة بتطاوين ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة بهضاب القيروان ومشروع التنمية الزراعية والرعووية والنهوض بالمبادرات المحلية بالظاهر والواغرة من ولايتي قبلي وتطاوين ومشروع مقاومة التصحّر والتنمية المستدامة بتشريك المستغلين المحليين بمنطقة الصخيرات من ولاية القصرين.

الخلاصة

تبرز مظاهر اختلال التوازن البيئي في تضرر مختلف المنظومات البيئية الطبيعية .
إنّ اكتساح الإنسان لمختلف المنظومات البيئية الساحلية والغابية والصحراوية ...
والاستغلال المفرط لمواردها وتدمير مواطن عيش الحيوانات والنباتات أدى إلى
الإضرار بالمقومات الأساسية لحياة الكائنات الحية وبالتالي إلى تناقص هام في الأنواع
الحيوانية والنباتية وانقراض بعضها أحيانا .

للإنسان دور هام في المحافظة على التوازن البيئي والتنمية المستدامة وذلك بالاستغلال
الرشيد للموارد الطبيعية للوسط

- 1 - ترشيد الصيد البري والبحري طبقا للنصوص القانونية المنظمة لذلك .
- 2 - المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته .
- 3 - المحافظة على الموارد المائية وحسن التصرف فيها .
- 4 - المحافظة على التربة من الاجراف والتصحر.



تمرين عدد 1 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة والفهم

تبرز الوثيقة 44 الموالية تركيز مبيد في أجسام كائنات حيّة بمنطقة ساحليّة وفي مياه السيّلان التي تصبّ في البحر.




الوثيقة 44

- 1 - قارن كمية المبيد في أجسام الكائنات البحرية بالاعتماد على الوثيقة 44 ماذا تلاحظ ؟
- 2 - ماهو تأثير المبيد على حلقات السلاسل الغذائية داخل هذا الوسط البحري وبالتالي على التوازن البيئي إذا علمت أنّ ارتفاع تركيز هذا المبيد داخل جسم مستهلك معيّن يتسبّب في موته ؟

تمرين عدد 2 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة والتحليل

تمثل الوثيقة 45 مدرّجين بيانيين لأربعة مناطق مختلفة : المدرّج الأول يتعلّق بعدد الصيادين والمدرّج الثاني يتعلّق بالمساحات المخصّصة للصيادين .




الوثيقة 45

- 1 - حدّد عدد الصيادين في كل منطقة .
- 2 - قارن بين عدد الصيادين والمساحة المخصّصة للصيد في كلّ منطقة . فسّر الاختلاف .
- 3 - كثيرا ما يقول الصيادون لاتوجد طرائد حلل سبب ذلك .

الإصلاح

تمرين عدد 2 :



1 - تحديد عدد الصيادين في كل منطقة

المناطق	1م	2م	3م	4م
عدد الصيادين	200	400	420	1950

2 - تحديد المساحة المخصصة للصيادين في كل منطقة

المناطق	1م	2م	3م	4م
المساحة المخصصة للصيادين بالهكتار	140	170	70	30

تبين مقارنة عدد الصيادين والمساحة المخصصة للصيد مايلي :

- زيادة تصاعديّة في عدد الصيادين من 1م إلى 4م حيث يتضاعف في المنطقتين 2م و3م مقارنة مع 1م ويصبح العدد في المنطقة 4م 5مرات أكثر من 1م .
- تناقص تنازلي للمساحة المخصصة للصيد من 1م إلى 4م .
- حساب المساحة المخصصة لكل صياد


المناطق	1م	2م	3م	4م
المساحة المخصصة لكل صياد بالهكتار	0.700	0.425	0.160	0.015

- يلاحظ عدم تناسب بين المساحة المخصصة للصيد وعدد الصيادين فكّما زاد عدد الصيادين نقصت المساحة المخصصة للصيد و اختلّ التوازن البيئي وتأثرت العلاقات الغذائية بين الكائنات الحيّة .
- 3 - إنّ سبب عدم وجود طرائد يعود إلى الإفراط في الصيد وكثرة الصيادين في نفس المنطقة .


تمرين عدد 3 :

الهدف : اختبار القدرة على المقارنة والفهم

- 1 - قارن السلاسل الغذائية في الوثيقتين 46 و 47 .
- 2 - بين تأثير صياد السمك والغواص في التوازن البيئي في الوسط الشاطئي .



الوثيقة 46



الوثيقة 47

التنوع البيولوجي موروث مهدد بالزوال

التنوع البيولوجي :

هو تنوع بالعدد والكثافة لأشكال الحياة الحيوانية والنباتية وللمنظومات البيئية التي تعيش فيها .

المنظومة البيئية :

هي العلاقة بين المجموعة الحياتية والمكونات غير الحية (المدى الجغرافي الحيوي) .

مثال 1 : المنظومة البيئية للجزر

توجد حوالي 60 جزيرة في عرض السواحل التونسية تعيش عليها بعض أنواع الحيوانات التي تتطلب عناية متأكدة مثل السلاحف البحرية التي تعيش حاليا وأساسا بجزر قورية وهي مهددة بالانقراض شأنها في ذلك شأن طائر النورس المهدد هو الآخر بالزوال والذي نجده في جزيرة زمبرة

مثال 2 : المنظومة البيئية للمناطق الرطبة

يوجد بتونس 220 منطقة رطبة تكتسي البعض منها أهمية كبرى لأنها تمثل نظاما بيئيا غنيا يحظى باهتمام وطني كما أنه محلّ انشغال أطراف عالمية مثل : بحيرة اشكل .

التهديدات : استعمال المبيدات ، المخلفات الصناعية ، المياه المستعملة .

مثال 3 : المنظومة البيئية للسباسب

تضمّ السباسب العليا (جهة القصرين) نباتات كثيفة من الحلفاء تستغلّ لصناعة الورق، وتعيش في هذه السباسب حيوانات مهددة بالانقراض مثل طائر الحباري

كيفية حماية الأنواع المهددة بالانقراض :

إنّ زوال بعض الأنواع من الحيوانات ليس أمرا حتميا بل يمكن للإنسان أن يتدخل لإنقاذها وحمايتها عن طريق سنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بالحدّ من عمليّة الصيد أو منعها أو بمساعدتها على التطوّر والنموّ داخل محميات تجعلها في مأمن من الخطر . وتوجد بالبلاد التونسية 8 حدائق وطنية و 16 محمية طبيعية لحماية المنظومات البيئية الهشّة والمحافظة عليها سيما وأنّها تحتوي على أنواع حيوانية ونباتية مميّزة أو نادرة أو مهددة بالانقراض .

الحديقة الوطنية :

الحديقة الوطنية مجال متّسع نسبيا يشكّل نظاما بيئيا لم يتعرّض للاستغلال أو للغزو، وهو يميّز باحتوائه على أنواع حيوانية ونباتية خصوصية وعلى مواقع تضاريسية وجغرافية ذات قيمة علمية خاصّة إلى جانب كونه يوفر فضاء تربيويا وترفيها ملائما وتتميّز هذه الحدائق بجمال المشاهد الطبيعية .

المحمية الطبيعية :

المحمية الطبيعية هي موقع محدود الاتّساع تتمثّل وظيفته في صيانة بعض الأنواع بشكل فردي أو جماعي ليضمن بقاءها حيث أنّه يوفر لهذه الأنواع المأوى وبيسر بقاء أنواع الحيوانات المهاجرة ذات الأهمية الوطنية والعالمية .

الفهرس

الجزء الأول : تحسين الإنتاج النباتي.....4

المحور الأول : التغذية عند النبات الأخضر.....7

الدرس 1 : تغطية حاجة النبات الأخضر للماء.....8

الدرس 2 : تغطية حاجة النبات الأخضر للأملاح المعدنية.....19

المحور الثاني : التغذية الكربونية عند النبات الأخضر.....32

الدرس 1 : التركيب الضوئي.....33

الدرس 2 : تحسين الإنتاج النباتي بالتأثير على شروط التركيب الضوئي....47

المحور الثالث : التكاثر والنمو عند النبات الأخضر.....53

الدرس 1 : التكاثر الخضري عند النبات الزهري.....55

الدرس 2 : التكاثر الجنسي عند النبات الزهري.....64

الدرس 3 : الإنتاش والنمو.....73

المحور الرابع : الفلاحة البيولوجية.....85

الجزء الثاني : تحسين الإنتاج الحيواني.....103

المحور الأول : التغذية عند الحيوان.....105

الدرس 1 : تنوع الأنظمة الغذائية عند الحيوانات.....106

الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على غذائه.....116

المحور الثاني : التكاثر عند الحيوان.....127

الدرس 1 : التكاثر عند الطيور.....129

الدرس 2 : تحسين إنتاج بعض الحيوانات بالتأثير على نموها.....140

المحور الثالث : النمو عند الحيوان.....148

الدرس 1 : دراسة النمو عند بعض الحيوانات.....150

الدرس 2 : تحسين الإنتاج الحيواني بالتأثير على النمو.....158

الجزء الثالث : العلاقات الغذائية والتوازن البيئي.....163

الدرس 1 : العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية.....165

الدرس 2 : التوازن البيئي.....178

المراجع

- 1-Sciences de la vie et de la terre 2de . Bordas
- 2- Sciences de la vie et de la terre 1ère . Bordas
- 3- Sciences de la vie et de la terre 1ère Année de l'enseignement secondaire(C .N.P)
- 4- Sciences de la vie et de la terre 3ème Année Maths(C.N.P)
- 5-Biologie cours oria 1ère AB . Hatier
- 6- Biologie 5ème . Hatier
- 7-Sciences et techniques biologiques 5ème . Magnard
- 8-Biologie 5ème . Bordas
- 9-Biologie Géologie 1ère . Nathan
- 10-Géologie écologie 2ème Année secondaire(C.N.P)
- 11-Sciences naturelles 2ème J.L.Morère . Hachette
- 12-Biologie seconde . Bordas
- 13-Biologie 6ème . Nathan
- 14-La nature et vous biologie 6ème . Hachette
- 15-Biologie 6ème . Bordas
- 16-Biologie 6ème . Hatier
- 17-Nature et sciences 6ème . Istra
- 18-Sciences de la vie et de la terre 2ème Nathan
- 19-Biologie 5ème . Bordas
- 20-Rapport national état de l'environnement Tunisie 2003

مواقع الأنترنت

الجزء الأول : تحسين الإنتاج النباتي

- 1-http://www.ctab.nat.tn/d_bio.htm
- 2-foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/nya/botanique/notesnutrition/notesnutrition1.htm
- 3-orgprints.org/4793
- 4-fibl
- 5-<http://www.tunisie.com/APIA>

الجزء الثاني : تحسين الإنتاج الحيواني

- 1-http://www.gipaweb.com.tn/Home_a.htm
- 2-<http://www.cuniculture.info/Docs/indexmag.htm>
- 3-http://www.lapiniere.com/82_alimentation_du_lapin.htm
- 4-<http://www.sasso.fr/poules-repro-lourdes.php?produit=selection-reproducteurs&lg=fr>
- 5-http://www.reefnet.gov.sy/agri/Fish_Feeding.htm

الجزء الثالث : العلاقات الغذائية والتوازن البيئي

- 1-<http://www.alkhadra.com/environment/index.htm>
- 2-http://www.istidama.nat.tn/Arabe/Accueil_Interactive-AR.htm