Les paradisiers

Les paradisiers, ou oiseaux de Paradis, vivent dans les forêts humides des montagnes de la Nouvelle-Guinée. On a dénombré quarante espèces de paradisiers. Ces oiseaux ont été longtemps chassés pour la beauté de leurs longues plumes qui servaient à décorer les chapeaux des dames européennes. Ils sont aujourd'hui protégés par la loi. Le Paradisier de Raggi est l'emblème de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Morphologie

Les mâles adultes des paradisiers possèdent souvent un magnifique plumage coloré et une queue formée de longues plumes. Ils ont un bec assez gros et des pattes robustes. Les plus petites espèces mesurent environ 15 cm pour un poids de 50 grammes, tandis que les plus grandes peuvent atteindre 110 cm et plus de 400 grammes.

Comportement

Dans les forêts de Papouasie, les prédateurs sont rares et la nourriture disponible toute l'année. Les paradisiers n'ont pas besoin de lutter pour survivre. Le plus important est de séduire les femelles. Les mâles des différentes espèces de paradisiers rivalisent donc de beauté lors de parades nuptiales qui ressemblent à de véritables cérémonies. Ils dansent, ils sautillent, ils frappent bruyamment leurs ailes, agitent leurs plumes, ouvrent grand leur bec, et crient en produisant un vacarme parfois proche du bruit d'un marteau piqueur !

Reproduction

La plupart des paradisiers sont polygames, c'est-à-dire qu'ils s'accouplent avec plusieurs femelles. Ils construisent un nid avec de la mousse et des plantes grimpantes, qui est garni de racines et de feuilles. Il est fixé sur de petites branches ou sur la fourche d'un arbre, parfois dans la cavité d'un tronc. Les plus grandes espèces pondent presque toujours un seul oeuf et les plus petites en pondent deux ou trois. L'incubation dure entre deux à trois semaines et les poussins quittent le nid entre 16 et 30 jours. Les mâles atteignent l'âge adulte entre 3 et 6 ans, lorsque les fils recourbés de la queue se sont totalement développés.

Alimentation

Les paradisiers se nourrissent à la fois de fruits et d'insectes (fourmis, criquets, coléoptères), et parfois de grenouilles arboricoles, d'araignées et de lézards. Ils recherchent très souvent leur nourriture dans la cime des arbres.