




أسماء الإيميم

بحث حول الحيوانات الولودة والبيوضة

والتنفيس

السنة الثالثة « د »



2013 / 2012

الحيوانات الولودة

التكاثر عند الحيوانات الولودة

الهدف من هذا البحث

أن يعرف المتعلم طريقة التكاثر عند الحيوانات الولودة
ويضرب أمثلة لذلك.

كل الكائنات الحية تتكاثر كي تستقيم الحياة على وجه الأرض،
فالنبات يتكاثر والإنسان يتكاثر وكذلك الحيوان، والحيوانات
نوعان من حيث طريقة تكاثرها، إذ نجد الحيوانات البيوضة
التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، والحيوانات الولودة التي
تتكاثر بالولادة.

تنتمي الحيوانات الولودة بشكل أساسي إلى عائلة الثدييات،
وبعد أن يتم اللقاء بين الذكر والأنثى تحمل الأنثى صغيرها أو
صغارها في بطنها مدة زمنية تعرف بالحمل. ويختلف عدد
الصغار في كل ولادة من حيوان إلى آخر كما يختلف عدد
الولادات ومدّة الحمل. وبعد فترة الحمل تضع الأم ما في
بطنها وتقوم برعايته وإرضاعه حتى يصبح قادرا على
الاعتماد على نفسه.

والحيوانات الولودة قد تختلف في نوع غذائها وفي نمط تنقلها،
ولكنّها تتكاثر بنفس الطريقة.
فنجد من بين الحيوانات الولودة من هو لاحم و من هو عاشب
و من هو كالش، ومثال ذلك:

القط

| تصنيفه | حسب | نوع | الغذاء: | حيوان | لاحم |
|-------------|-----------|------------|--------------------|-------|------|
| عدد | الولادات: | مرتين | في | السنة | |
| فترة | الحمل: | 62 | - | 65 | يوما |
| عدد | الصغار: | من 3 إلى 5 | وتصل أحيانا إلى 10 | هرر | |
| فترة | الرضاعة: | 45 | | يوما | |
| اسم | | الذكر: | | قط | |
| اسم | | الأنثى: | | قطعة | |
| اسم الصغير: | | | | | هر |

الأرنب

| تصنيفه | حسب | نوع | الغذاء: | عاشب |
|-------------|-----------|-------------|---------|----------|
| عدد | الولادات: | متوسط 7 | مرات | في السنة |
| مدة | الحمل: | 31 | | يوما |
| عدد | الصغار: | من 8 إلى 16 | خرنق | |
| فترة | الرضاعة: | 4 | - | 5 أسابيع |
| اسم | | الذكر: | | أرنب |
| اسم | | الأنثى: | | خرنقة |
| اسم الصغير: | | أرنبة | أو | خرنقة |

الخنزير البري

| | | | | |
|--------|-----------|------------|---------|----------|
| تصنيفه | حسب | نوع | الغذاء: | كالش |
| عدد | الولادات: | تصل إلى 4 | مرات | في السنة |
| مدة | الحمل: | 112 - 115 | | |
| عدد | الصغار: | من 4 إلى 6 | خنانيص | |
| فترة | الرضاعة: | 2 - 3 | أشهر | |

اسم الذكر: خنزير
اسم الأنثى: خنزيرة
اسم الصغير: خنوص

ونجد من بين الحيوانات الولودة من يمشي ومن يقفز ومن يجري ومن يسبح ومن يطير، مثال ذلك:

الكلب

نمط التنقل: المشي
عدد الولادات: مرة أو مرتين في السنة
مدة الحمل: متوسط 62 يوما
عدد الصغار: من 4 إلى 8 جراء
فترة الرضاعة: 3 - 7 أسابيع
اسم الذكر: كلب
اسم الأنثى: كلبة
اسم الصغير: جرو

الكنغر

نمط التنقل: القفز
مدة الحمل: 200 يوما
عدد الصغار: 1
فترة الرضاعة: بعد خروج الصغير تقوم الأم بإرضاعه وإدخاله مباشرة إلى جيبها وذلك حتى يستكمل مراحل النمو وكذا حمايته من الأعداء، ويبقى الصغير حوالي سنة أو سنة

ونصف في الجيب حتى تحس الأم أنه أصبح قادرا على تحمله
المسؤولية.

الثعلب

نمط التنقل: الجري
عدد الولادات: مرة واحدة في السنة
مدة الحمل: قرابة شهرين
عدد الصغار: من 5 إلى 7 ضغابيس
اسم الذكر: ثعلب
اسم الأنثى: ثعلبة
اسم الصغير: ضغبوس

حوت البالين

نمط التنقل: السباحة
عدد الولادات: مرة كل 3 سنوات
مدة الحمل: أكثر من 10 أشهر
عدد الصغار: 1

الخفاش: وفيه أكثر من 950 نوع

نمط التنقل: الطيران
عدد الولادات: أغلب أنواعه يلد مرة واحدة في السنة
مدة الحمل: تتراوح بين 40 يوما و8 شهور حسب النوع
عدد الصغار: 1 عند معظم الخفافيش
فترة الرضاعة: من 18 يوم إلى 9 أشهر حسب النوع

الحيوانات السيوفية

التكاثر عند الحيوانات البيوضة



الهدف من هذا البحث

أن يعرف المتعلم طريقة التكاثر عند الحيوانات البيوضة
ويضرب أمثلة لذلك.

هناك العديد من الحيوانات التي تتكاثر عن طريق وضع البيض، كالطيور والكثير من الحيوانات البحرية ومعظم الزواحف والحشرات. هذه الحيوانات تسمى: الحيوانات البيوضة.

وتزاوج هذه الحيوانات (الإخصاب) يكون إما داخليا أو خارجيا:

فالإخصاب الخارجي يكون عبر تلاقي الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية فيقوم الذكر بحقن نطفته داخل الأنثى حيث يتم إخصاب البويضات داخل جسمها، والحيوانات ذات الإخصاب الداخلي تنتج بويضات ونظفا أقل لأن إمكانية تلاقي الأمشاج يكون أكثر احتمالية. أما الإخصاب الخارجي فيكون باتحاد البيض بالنطف خارج

جسم الأنثى، فالأنثى تضع بيضها ثم يضيف الذكر نطفه إليها. ومعظم الحيوانات التي يكون إخصابها خارجيا تنتج فيضا من البيض والنطف لضمان الإخصاب لأكثر عدد منها وهذا المثال موجود خاصة عند بعض الأسماك.

تختلف الحيوانات البيوضة في ما بينها في طريقة وضع البيض وعدده، وطريقة صنع العش ومكانه، وطريقة الحضانه ومدتها، وفي كيفية رعاية الصغار. وسنضرب أمثلة على ذلك:

الدجاج



في موسم الحضانه يقوم المربي عادة بوضع البيض المخضب - الذي قام بجمعه من قبل - في مكان مخصص لذلك الغرض لكي تقوم الدجاجة بحضانهه لمدة 21 يوما. وذكر الدجاجة وهو الديك لا يقوم بحضانهه البيض معها، بل تظل الدجاجة وحدها طول هذه المدة في ذلك المكان تحضن بيضها ولا تغادره إلا للأكل أو الشرب. وعند نهاية هذه الفترة يبدأ البيض بالتفقيس، وتخرج الفراخ من البيض وتبدأ في النقر بحثا عن

الطعام وتكون الدجاجة قدوتها في ذلك حتى تصبح قادرة على
حماية نفسها.

الحمام



يتميز الحمام بقدرته على التكاثر السريع في أي مكان تتوفر فيه مصادر التغذية ومياه الشرب. وفي موسم التكاثر وبعد أن يتم اختيار مكان العش ويتم صنعه من القش والأعشاب الجافة، وبعد عملية الإخصاب تقوم الأنثى بوضع البيضة الأولى الملقحة في اليوم التالي من التزاوج ثم البيضة الثانية بعد يومين. وتختلف بيضة الحمامة عن بيضة الدجاجة في ضعف قشرتها وصغر صفارها النسبي عن صفار بيض الدجاج ويبلغ وزنها حوالي 21 جرام. تدوم فترة حضانة البيض 18 يوما، يشارك كل من الذكر والأنثى فيها حيث يتولى الذكر المهمة بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 16 وتتولى الأنثى المسؤولية بقية ساعات اليوم. وقبل موعد الفقس بيوم تبدأ الصغار في نقر البيضة حتى تحدث شقا في القشرة ليسمح للأفراخ بالخروج منها، وغالبا ما يكون الفقس للبيضتين معا. وتكون الأفراخ

الناجة صغيرة جدا ووزنها حوالي 15 جرام، والجسم عار
إلا من بعض الزغب الخفيف.
تسهر كبار الحمام على احتضان الأفراخ وتقوم بتغذيتها
بواسطة نظام يشبه الترجيع، حيث يقوم الحمام الكبير بإيلاج
منقارها داخل مناقير الأفراخ لتتغذى على لبن الحوصلة،
وتنفرد ذكور الحمام عن بقية ذكور الطيور الأخرى بقدرتها
على استرجاع لبن الحوصلة وتغذية الأفراخ بها. وفي عمر
ثلاث أسابيع تقريبا يبدأ الصغار بتناول الطعام بمفردهم.

الوقواق



يطلق اسم الوقواق على مجموعة من الطيور، بينهما قرابة
وتنتشر في أغلب أنحاء العالم. ولهذه الطيور مناقير طويلة
نوعاً ما ومقوسة قليلاً، وتختلف عن معظم الطيور في أن
اثنتين من أصابعها تتجهان للأمام والاثنتين الأخرين تتجهان
للخلف. والوقواق الشائع لا يهتم برعاية صغاره مثل الكثير
من أنواع الوقواق الأخرى في العالم القديم، وهو يضع بيضه

في عش طائر آخر ويتركه ليفقس وليتولى الآخر رعايته. ويكتمل تكوين بيضة الوقواق بسرعة كبيرة، وعادة تكون أول ما يفقس من البيض. ويأخذ الوقواق الحديث الفقس في التنقل داخل العش؛ حتى يتلامس الجزء الغائر الموجود في ظهره مع بيضة أخرى أو فرخ صغير، وعندئذ يتسلق الوقواق جوانب العش برجليه القويتين، ويقذف بالبيض والأفراخ الأخرى إلى خارج العش. ويظل طائر الوقواق يكرر هذه الحركة؛ حتى يخلو العش تماماً من سائر البيض والأفراخ، ويبقى فرخ الوقواق وحده ليتلقى كل الغذاء الذي يجلبه أبواه البديلان.


السلحفاة البحرية



تضع السلحفاة البحرية البيض في مجموعات وعلى الشواطئ عندما يكون المد منخفضاً. ويتم وضع البيض عادة في نفس مكان ولادة الأنثى وعادة ما يكون ليلاً لتجنب حرارة الجو. فتقوم بحفر حفرة تضع فيها بين 70 و 200 بيضة لتحظى بالدفء، وحينما يفقس البيض تنطلق الصغار بشكل

غريزي إلى الماء لتستكمل دورة حياتها.

الفراشة



تضع الفراشة بيضها على ورقة من الشجر، ثم تفقس البيضة ويخرج منها الأسروع (اليرقانة) فتبدأ اليرقانة بأكل بقايا البيضة ثم تأكل الورقة التي هي عليها وما حولها وتنمو فيبدأ جلدها في الانسلاخ حتى يصل إلى الانسلاخ الأخير فتتوقف اليرقانة عن الأكل وتحبس نفسها داخل شرنقة وتتحول هذه اليرقانة تحولات عديدة داخل الشرنقة حتى تخرج في ما بعد فراشة مكتملة.


التمساح



تضع أنثى التمساح ما بين 30 إلى 60 بيضة في المرة الواحدة. ويشبه بيض التماسيح بيض الدجاج، إلا أنه أكبر منه حجماً وقشرته أقل بريقاً. تخفي التماسيح بيضها في أعشاش من الفضلات والنبات أو تدفنه في الرمل على الشواطئ. وتقوم الأنثى في بعض الأنواع بحراسة العش إلى أن يفقس البيض. وعندما تسمع أصوات الصغار تحفر لإخراجها من العش. وتساعد بعض أنواع التماسيح صغارها على الخروج من البيض، ثم تحملها في أفواهها إلى الماء.

التتفيس

جهاز التنفس



لوحة توضيحية لجهاز التنفس

جهاز التنفس يزود خلايا **جسم الإنسان بالأكسجين** الضروري لأنشطتها، ويخلصها من ثاني أكسيد الكربون (نتاج عملية الأكسدة فيها). يمر هواء **الشهيق** عبر الرغامى والقصبتين (شعبتيه الأضيق اللتين تنفرعان منه قبل الدخول للرئتين) إلى الرئتين. وتشمل كل رئة كثيراً من القصيبات، والتي تنفرع إلى شعيبات تنتهي بعدد لا يحصى من الحويصلات الهوائية (أو الاسناخ) المبطنه باغشية رقيقة جداً يجري عبرها تبادل الغازات بينها وبين الشعيرات الدموية التي تحيط بالأسناخ. وتعمل العضلات الوربية (بين الاضلاع) و**الحجاب الحاجز** (تحت الرئتين) على تشغيل الرئتين كالكبير (منفاخ الحداد)، تسحب الهواء اليهما ثم تدفعه خارجهما في فترات منتظمة.

يتم الحصول على **الأكسجين** بواسطة عملية التنفس التي يقوم بها الجهاز التنفسي.

محتويات

[أخف]

1المجاري التنفسية

○ 1.1 الأنف

○ 1.2 البلعوم

○ 1.3 الحنجرة

○ 1.4 الرغامى

○ 1.5 الشعب الهوائية

2الرتتان

3الأوعية الدموية الرئوية

4وظائف التنفس

5دور الممرات الهوائية في التنفس

○ 5.1 دور الجنبه (pleura) في التنفس

○ 5.2 دور الأسناخ في آلية التنفس

6التبادل الغازي

7العوامل المؤثرة في عملية التنفس

8التنظيم عقب التنفس

9المراجع

10انظر أيضا

المجاري التنفسية

وتشتمل على سلسلة من الأعضاء تنقل الهواء إلى الرئتين وهذه الأعضاء هي كل من

الأنف

جهاز غضروفي تتصلان مع الخارج بالانفين وهما مبطنان بغشاء مخاطي مهدب يرطب ويسخن الهواء وينقيه. يقوم الانف بدور اساسي في عملية التنفس وكذلك الشم وهو يقع في مقدمه ألوجه ويتكون من هيكل عظمي و غضروفي مغطى بالجلد ويغطي سطح التجويف الانفي ماده مخاطيه وشعيرات دمويه وشعر الصغير

البلعوم

وهو الممر المباشر والممتد من ممر الانف من الخلف، الجزء الامامي منه مبطن بغشاء مخاطي والجزء الخلفي عبارة عن ممر مشترك للغذاء والهواء معا، تتصل به من الامام القصبه الهوائية ومن الخلف المريء، ويمر من البلعوم خلال فتحة المزمار إلى الحنجرة.

الحجرة

وهو عضو غضروفي تمتد في داخله ثنيات غشائية عضلية تكون الحبال الصوتية، فتهتز هذه الحبال بتأثير الهواء الصاعد من الرئتين فتنتشأ عنهما الأصوات، فالحجرة هي عضو الصوت، تفتح الحجرة بفتحة المزمار، ويسدها عند البلع غضروف لسان المزمار.

الرغامى

وهي أنبوب يتكون من غضاريف شبه دائرية تدعم الناحية الأمامية بينما يوجد في الناحية الخلفية التي يستند إليها المريء عضلات ملساء وأربطة ليفية مارنة (fibroelastic ligaments) تصل نهايات الغضاريف ببعضها؛ فتكون وظيفة الغضاريف منع توسع تجويف الرغامى فوق المطلوب، كما أن العضلات والأربطة تحافظ على قطر مناسب لتجويف الرغامى، وانقباض هذه العضلات وبالتالي تضيق تجويف الرغامى يلعب دوراً في السعال كما يساهم انقباض العضلات في تنظيف مجرى التنفس. يبطن القصبة غشاءً مخاطي ذو أهداب مهتزة مخاطية تستوقف الغبار، والجزئيات التي ترافقه، ويدفعها نحو الخارج فهذه الأهداب تعمل كالمكنسه.

الشعب الهوائية

تتفرع الرغامى بعد مسافة من الحجرة إلى قصيبات أصغر كأغصان الشجرة ويشكل مجموعها الشجرة القصيبية.

الرئتان

وتوجد **الرئتان** في الفراغ الصدري محاطتين بالغشاء البلوري الحشوي داخل حجرة جدارها من الضلوع والقص والعمود الفقري ودعامتهما الحجاب الحاجز. وهما عضوان إسفنجيان مرنان يشتملان على الشجرة القصيبية التي تنتج عن الحويصلات الرئوية. وينقسم جوف كل حويصلة إلى عدد من التحذبات هي الاسناخ الهوائية التي تزيد من سعة السطح الداخلي للهواء. تجتمع الاسناخ لتشكل حويصلات، وتجتمع الحويصلات لتشكل كتلا هرمية الشكل تدعى الفصيصات الرئوية. وتجتمع الفصوص الرئوية وعددها ثلاثة في الرئة اليمنى وفصان فقط في الرئة اليسرى.

الغشاء الجنبى (pleural membrane): يحيط بكل رئة غشاء ذو ورقتين يدعى الغشاء الجنبى، تلتصق الوريقة الداخلية بالرئة بينما تلتصق الوريقة الخارجية بالوجه الداخلي **للقص الصدري** وبفضلها تتصل الرئتان بالقفص الصدري.

الأوعية الدموية الرئوية

يخرج **الشريان الرئوي** من **البطين الأيمن** فينقسم إلى قسمين ينفذ كل منهما إلى رئة ويسير محاذياً للقصبة الهوائية ويتفرع مثل تفرعها حتى ينتهي في محيط الأسناخ. فيتشكل حولها شبكات شعرية غزيرة، وينتج عن اجتماع الشعيرات فروع **وريدية** تتلاقى فتشكل وريدين في كل رئة وتخرج الأوردة الرئوية الأربعة وتصب في **القلب في الأذين الأيسر** وبما أن جدران الاسناخ الرئوية رقيقة جداً فيكون الدم فيها وهواء الاسناخ على اتصال مباشر بسطح واسع جداً وتتم عندها التبادل الغازي الرئوي.

وظائف التنفس

يقوم التنفس بالوظائف التالية:

1. تزويد الجسم بالأكسجين من الجو إلى الرئتين، ثم أكسدته في الرئتين، بفضل الضغط الجزئي للأكسجين في الأسناخ والأوعية الدموية.
2. طرح ثاني أكسيد الكربون: وذلك بفضل فرق الضغط الجزئي له في الخلايا والأوردة والاسناخ.

3. المحافظة على التوازن الحامضي_القاعدي أو الرقم الهيدروجيني.
4. المحافظة على حرارة الجسم: نتيجة لعمليات الاحتراق والهدم والبناء داخل الجسم ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية فيعمل بعدة طرق للتخلص من الحرارة الزائدة وهذه الطرق والوسائل هي: الجهاز العصبي، الغدد الصماء، الرنتان.

يتم تجديد الهواء داخل الرنتين بواسطة ظواهر ميكانيكية، أولها حركة العضلات التنفسية التي تعمل على تغيير حجم القفص الصدري أثناء الشهيق والزفير، والتغلب على مقاومة الممرات الهوائية والجنبه الرئوية. وتنقسم عملية التنفس إلى مرحلتين متابعتين بشكل متلاحق ومستمر هما الشهيق والزفير:

1. الشهيق (بالإنجليزية: Inspiration): وهو عملية فاعلة، تتطلب جهداً من أعضاء الجهاز التنفسي،

وخاصة العضلات لإدخال الهواء إلى الرنتين

1. الحجاب الحاجز: تنقلص عضلة الحجاب الحاجز فتتهبط للأسفل فيتسع القفص الصدري عمودياً أو طولياً

ويقل الضغط داخل الرنتين إلى أن يصبح أقل من الضغط الجوي فيندفع الهواء داخلهما.

2. العضلات الوربية الخارجية: وتعمل على رفع القص ودفعه للأمام مما يزيد من حجم القفص الصدري من الأمام للخلف وجانبياً.

2. الزفير (بالإنجليزية: Expiration): وهو عملية سلبية أو تلقائية لا تتطلب جهداً لإخراج الهواء خارج الجسم، وإنما

تأتي كنتيجة حتمية لعملية الشهيق ولكن في الحالات الاضطرارية، تتدخل عضلات البطن والعضلات الوربية

الداخلية لتضيق القفص الصدري، فيرتفع الضغط داخل الرنتين فيطرد الهواء منهما عبر الممرات الهوائية خارج الجسم.

معدل التنفس: يكون وقت الشهيق أطول من وقت الزفير، كما نلاحظ لحظة توقف عند نهاية الشهيق. ويتراوح معدل التنفس عند الرجل السوي بين 13-18 دورة في الدقيقة وفي المتوسط 16 دورة في الدقيقة ويزداد هذا المعدل في حالات الحرارة والعمل، وهو عند المرأة أكثر منه عند الرجل بدورتين.

[عدل] دور الممرات الهوائية في التنفس

ليست الممرات الهوائية مجرد قنوات صافية، وإنما تلعب دوراً في عمليتي الشهيق والزفير، فأثناء الشهيق تتناول وتنسج إلى أقصى حد لتسهل مرور الهواء، بينما وقت الزفير يقل طولها وقطرها بفعل ارتفاع الضغط داخل القفص الصدري للإسراع في طرح الهواء وكذلك تقوم بطرح وإخراج الإفرازات التي يبلغ حجمها الطبيعي 150 مللتر يومياً ويزداد في الحالات المرضية.

[عدل] دور الجنبه (pleura) في التنفس

تعمل بورقتيها الجدارية والحشوية على دعم الرنتين والجدار الصدري وهي تسمح للرنتين بالتمدد الأعظمي، كما تسمح لها بالحركة التي تنقلها لهما من جدار القفص الصدري وبناء على ذلك فإن الضغط داخل الفجوة بين ورقتي الجنبه أثناء الزفير يستخدم سلبياً وهو يساوي -3 ضغط جوي ويزداد سلبياً أثناء الشهيق إذ يتراوح ما بين 6-10، أما في حالة الزفير الإجباري قد يصل إلى +4 بينما ينخفض أثناء الشهيق الإجباري إلى 30 ضغط جوي.

[عدل] دور الأسناخ في آلية التنفس

تلعب الأسناخ دوراً هاماً وذلك بفضل مطاطية جدرانها والألياف العضلية بين الأسناخ وخاصة بفعل تأثير "فاعل السطح" (فاعل السطح أو surfactant هو سائل يحتوي على مواد مختلفة من ليبيدات مفسفرة وبروتينات وأيونات، وتفرزه خلايا

خاصة في الأسناخ، وهو السبب في عدم انكماش الأسناخ عند الزفير؛ فلو أغلقت الأسناخ يصعب فتحها من جديد بطرق عادية)، ومن أهم وظائف الأسناخ أنها مكان تبادل الغازات بين الرئتين والدم لنقله لباقي أعضاء الجسم.

[عدل]التبادل الغازي

تشكل الأسناخ أو الحويصلات الرئوية المكان الذي يتم فيه تبادل الغازات بين الهواء الجوي والأوعية الدموية، والطبيعة الفسيولوجية والتشريحية للأسناخ تسمح بهذا التبادل ذلك أن الأسناخ ذات جدار رقيق جداً، ومحاطة بشبكة من الشعيرات الدموية مساحتها حوالي 70 م² تحتوي خلايا تفرز مادة خاصة وهي "فاعل السطح" أو surfactant (تحافظ على مطاطية الرئة واتساعها)، وخلايا بالعة، وأنسجة خاصة، وتقوب لكل هذه العوامل تعمل على تسهيل مرور الهواء من وإلى الأسناخ وتتم عملية التبادل الغازي بأربع مراحل هي:

1. تبادل الغازات بين هواء الجو والأسناخ، وتدعى التهوية الرئوية.
2. تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الأسناخ والشعيرات الدموية.
3. نقل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم.
4. تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بين الشعيرات الدموية والخلايا.

تأثير ثاني أكسيد الكربون الموجود في هواء الجو:

1. عندما تكون نسبة CO₂ في الهواء المستنشق طبيعية 0.05% لا يحصل أي تغيير على تنفس الشخص
2. إذا ارتفعت نسبة CO₂ في هواء التنفس إلى 3% يزداد عمق التنفس وتبقى سرعته بطيئة ويدعى ذلك فرط التهوية.
3. إذا ارتفعت إلى حوالي 5% تزداد سرعة التنفس وعمقه.
4. إذا ارتفعت إلى حوالي 6% تباطأت الوظائف الدورانية والتنفسية وأصابها الخمول والهمود ويصاب الشخص بالصداع والدوار والإغماء.

تأثير نقص الأكسجين في هواء الجو:

إن النسبة المئوية للأكسجين في الهواء الجوي 20.95% فإذا انخفضت إلى أقل من 13% فإن التنفس سيزداد سرعة وعمقاً وبذلك تزداد كمية الأكسجين في الأسناخ الرئوية فتطرد كمية CO₂ من الأسناخ فيقل عمق التنفس لفترة قصيرة يعود بعدها التنفس إلى عميقاً بسبب تجمع ثاني أكسيد الكربون ثانية، وهكذا يتغير عمق التنفس بصورة متناوبة بالزيادة والنقصان، ويدعى التنفس عندها بالتنفس الدوري المتناوب. إن ارتفاع نسبة CO₂ في الدم يحدث أثناء الوقف التنفسي وفي نفس الوقت ينخفض تركيز الأكسجين في الدم، فتتنبه مراكز التنفس الدماغية فتسبب في زيادة عمق التنفس وسرعته، فتحدث "زيادة التهوية" وبسبب هذا تزداد نسبة الأكسجين وينخفض تركيز CO₂ في الدم فيزول تنبيه المراكز التنفسية الدماغية فتعود ثانية حالة الوقف التنفسي إن هذا النوع من التنفس يدعى تنفس شاين ستول وهو تنفس دوري متناوب يدل على خطورة حالة الشخص، ويحدث في المناطق المرتفعة. إذا ارتفع الضغط الجزئي للأكسجين في هواء الجو فإنه سيحدث تخريشات في أنسجة الرئة، لذلك لا يجوز أن يتنفس الشخص أكسجيناً نقياً لفترة تزيد عن بضع ساعات إلا أنه من الممكن أن يتنفس مزيجاً غازياً مكوناً من 60% أكسجين و 40% لفترة طويلة دون أن يسبب أضراراً صحية.

نقص الأكسجين HYPOXEMIA المقصود بنقص الأكسجين هو النقص الحاصل عند مستوى خلايا أنسجة الجسم. أسباب نقص الأكسجين:

1. نقص الأكسجين بسبب نقص دخول الأكسجين للجسم. وذلك بفعل نقصان الضغط الجزئي للأكسجين (PO2) في الدم ويحدث في الأحوال التالية:

- في المرتفعات العالية حيث ينخفض الضغط الجزئي للهواء بما فيه الأكسجين.
- استنشاق هواء فاسد يحتوي على كمية ضئيلة من الأكسجين عند مستو سطح البحر.
- التنفس السريع السطحي.
- أمراض الرئتين.
- أمراض القلب الخلقية التي فيها اتصال بين طرفي القلب الأيمن والأيسر.

2. نقص الأكسجين بسبب فقر الدم : وينتج بسبب نقصان الهيموجلوبين في الدم الذي يحمل الأكسجين ويكون الضغط الجزئي للأكسجين ونسبة إشباعه طبيعيين ويحدث في جميع أنواع فقر الدم أو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون الذي يتحد مع الهيموجلوبين بنفس طريقة الأكسجين ولكن بشراهة تفوق اتحاد الأكسجين بـ 21 مرة مما يؤدي إلى نقصان الأكسجين الواصل إلى الأنسجة.

3. نقص الأكسجين التسممي: وذلك بفعل تسمم الخمائر المؤكسدة الموجودة في الأنسجة بمادة سامة مثل السيانيد حيث تصبح الأنسجة نفسها معطلة وغير قادرة على الاستفادة من الأكسجين الذي يكون ضغطه الجزئي طبيعياً ثم يرتفع في الأوردة ليصبح أعلى مما هو في الشرايين.

4. نقص الأكسجين الركوندي: وهو ناتج عن بطئ دوران الدم عبر الأنسجة فالضغط الجزئي للأكسجين في الدم الشرياني طبيعي وكمية الأكسجين المحمولة طبيعية، ولكن الضغط الجزئي للأكسجين وكميته في الدم الوريدي منخفضة جداً، وذلك في حالة هبوط القلب لأحنتاني.

العوامل المؤثرة في عملية التنفس

تخضع عملية التنفس إلى عدد من التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان وهذه العوامل والتغييرات هي:

1. عوامل عصبية مركزية:

- منطقة تحت المهاد تلعب دوراً أكيداً في اضطراب عملية التنفس، ويمكن ملاحظة ذلك أثناء الانفعال حيث تزداد سرعة التنفس.
- قشرة الدماغ تلعب دوراً في تغيير عملية التنفس أثناء الضحك أو الكلام أو الانتباه.

2. عوامل كيميائية : إن حدوث أي تغيير كيميائي للدم يعمل على اضطراب المراكز التنفسية العصبية المركزية، ويؤثر

بالتالي على عملية التنفس، ويتم هذا التأثير بطريقتين: إحداهما مباشرة على المراكز العصبية التنفسية والثانية غير مباشرة أي منعكس عن طريق المستقبلات الموجودة على جدران الشرايين الأبهري والسباتي العام. وأهم العوامل المؤثرة على التنفس هي درجة الحموضة (PH) ومعجهاز التنفس

أهمية الجهاز التنفسي: للتنفس دور كبير في المحافظة على استمرارية النشاط داخل الجسم فبالتنفس يتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر تراكمه ضار لخلايا الجسم ويوازن فقده بالحصول على الأكسجين الذي يعتبر الوقود الذي لا تستمر الحياة بدونه لما له الدور الكبير في استمرارية العمليات الحيوية داخل الجسم وعملية التزويد بالأكسجين هي عملية مستمرة لا تنقطع. ونقصان الأكسجين يؤدي نقصان التروية إلى الدماغ وبالتالي تظهر أعراض الدوار والتعب على المريض عادة أما في حالة انقطاعه انقطاعاً تاماً فإنه يؤدي إلى توقف عضلة القلب وبالتالي يعرض الإنسان إلى احتمالية كبيرة لفقده الحياة ما لم يتم انعاش القلب والرئة من جديد في وقت محدد. إذن فالتنفس هي عملية ضرورية لإمداد عضلة القلب بالأكسجين وبالتالي ضخ الأكسجين عن طريق الدم إلى سائر أعضاء الجسم وبالتالي تستمر عملية الحياة بانتظام داخل جسم الإنسان..

التنظيم عقب التنفس

إن عمل جميع أعضاء الجهاز التنفسي بشكل متناسق ومنسجم ومنتظم ومتواتر يتم تحت تأثير الجهاز العصبي الذي يحتوي على مراكز خاصة للتنفس في البصلة السيسائية وفي الحذبة الموجودة في منطقة الجسر من الدماغ وتشارك عدة أجزاء عصبية وكيمائية في تكوين الجهاز العصبي المنظم للتنفس وهي المستقبلات والعصبونات التنفسية الحسية ومراكز التنفس الدماغية والأعصاب التنفسية الحركية.

1. **المستقبلات التنفسية** : وهي عبارة عن مستقبلات كيميائية حسية توجد على جدران الشريان الأبهر والشريان السباتي العام. وتتأثر بالتغيرات الكيميائية في الجسم مثل نقصان الأكسجين أو زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون أو زيادة درجة الحموضة (نقصان العدد الهيدروجيني)

2. **العصبونات التنفسية الحسية** : وهي ألياف عصبية تصدر من المستقبلات ومن مراكز التخوية ومراكز النطخ في الرئتين، والمستقبلات الموجودة على العضلات الملساء في المسالك التنفسية لتصل إلى مراكز التنفس العليا في الدماغ. فيصدر من مستقبلات الشريان السباتي عصب الحبيب السباتي ويصل إلى مراكز الشهيق في البصلة السيسائية ويصدر من مستقبلات الشريان الأبهر العصب المثبط. ويصل إلى مركز الشهيق في البصلة، حيث يعمل هناك تشابكاً عصبياً حسياً ويتابع سيره إلى الأعلى ليصل إلى المركز الحديبي النهائي الموجود في الحذبة في منطقة الجسر الواقعة مباشرة فوق البصلة السيسائية وتتعبص الرئتين والرغامى بالعصب الحائر (المبهم) الذي يصل إلى البصلة.

3. **مراكز التنفس الدماغية**: توجد مراكز التنفس في:

- قشرة الدماغ وهي المراكز العليا
- البصلة السيسائية وهي:

1. **مركز الشهيق** : إثارة هذا المركز يؤدي إلى تقلص أو انقباض جميع عضلات الشهيق وإذا استمرت إثارته لفترة طويلة تؤدي إلى الموت بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم عن طريق طرحه للخارج.

2. **مركز الزفير** : إثارة هذا المركز تحدث زفيراً طويلاً يستمر من دقيقتين إلى ثلاث دقائق ولا تؤدي إثارته المستمرة للموت حيث إنه بمجرد ارتفاع معدل ثاني أكسيد الكربون في الدم يتنبه مركز الشهيق ويبدأ بالعمل فوراً وتحدث عملية الشهيق. وما تجب ملاحظته أن إثارة المركزين معاً تحدث تشنجاً شهيقياً ويتصلان فيما بينهما بأعصاب موصلة متبادلة.

• الحذبة (الجسر)

1. **مركز الشهيق العميق** : يرسل هذا المركز التنبيهات إلى مركز الشهيق في البصلة لإطالة فترة الشهيق ويتم تنظيم هذا التأثير بطريقتين هما:

- العصب الحائر (التائه)

- المركز الحديبي النهائي الذي يثبط مركز الشهيق

2. **المركز الحديبي النهائي**: يتلقى هذا المركز التنبيهات من مركز الشهيق ويرسل تأثيراته وتنبيهاته إلى مركز الزفير لإثارته من أجل إيقاف الشهيق.

4. **الأعصاب التنفسية الحركية** : وبعض هذه الأعصاب يصدر من قشرة الدماغ وبعضها يصدر من منطقة الجسر وتعمل تشابكاً آخر في النخاع الشوكي لتعطي العصبونات النهائية التي تصل عضلات التنفس لتنتقل إليها أوامر

الاستجابة. فالعصب الحجابي الذي يعصب الحجاب الحاجز يعمل تشابكه الثاني في الفقرة العنقية السابقة، بينما العصب الوربي الذي يعصب العضلات الور بين الأضلاع يعمل تشابكه الثاني في الفقرة الصدرية الأولى، أما العضلات الهيكلية فتتعصب بالأعصاب القادمة من الدماغ.