



Appollons (ici *Parnassius apollo*)

Taille : 50-80 mm.
Ailes blanches, pourvues de taches noires, notamment vers l'extrémité des ailes antérieures. Ailes portant des ocelles rouges sur le dessus des ailes.
Chenille : Orpins, Saxifrage et Joubarbe.



Soufrés et Fluorés (ici *Colias alfacariensis*)

Taille : 35-45 mm.
Face supérieure jaune fluorescent chez le mâle, blanc crayeux chez la femelle, avec une bande apicale noire maculée de clair. Revers des ailes postérieures orné d'une tache blanche en forme de 8, cernée de rose lilacée.
Chenille : Coronille bigarrée, Hippocrépide à toupet.



Grande tortue (*Nymphalis polychloros*)

Taille : 50-55 mm.
Comme la Petite tortue, mais le fond est d'un fauve plus terne, elle ne possède pas de petite tache blanche aux ailes antérieures, la tache noire aux ailes postérieures est plus petite et son envergure est nettement plus grande.
Chenille : Saule marsault, Peuplier tremble, Pommier, Poirier.



Carte géographique (*Araschnia levana*)

Taille : 28-40 mm.
1ère génération : ailes fauves orangées, ornées, de rangées de taches noires, ainsi que d'un chapelet de tache blanches aux ailes antérieures, et une série de lunules marginales bleues aux postérieures.



2nde génération : ailes noires, ornées d'une bande médiane blanche et d'une ligne fauve rougeâtre. Revers rouge violâtre et finement réticulé de blanc.

Chenille : Ortie.



Pacha à deux queues (*Charaxes jasius*)

Taille : 75-85 mm.
Brun noir, avec une bande marginale fauve orangée aux ailes antérieures et jaune aux postérieures. Ailes postérieures pourvues de deux queues. Dessous orné de motifs complexes. Aussi appelé Nymphale de l'arbousier.
Chenille : Arbousier.



Morio (*Nymphalis antiopa*)

Taille : 55-75 mm.
Brun violacé velouté, avec une large bordure marginale jaune et une rangée de taches bleues. Revers comparable, mais plus terne, sans taches bleues.
Chenille : Saules, Bouleau, Orme.



Petit mars changeant (*Apatura ilia*)

Taille : 50-60 mm.
Diffère du Grand Mars par la présence aux ailes antérieures, d'un ocelle cerné de fauve bien visible et par son revers aux dessins nettement plus fondus. La forme typique est noire à reflet bleu.
Chenille : Peuplier tremble, Saule marsault.



Lycènes orangés (ici *Lycaena virgaureae*)

Taille : 27-32 mm.
Mâles : rouge orangé vif, avec une bordure marginale noire, revers des ailes postérieures très différent, fauve avec une rangée de taches blanches.



Femelles : dans les mêmes tons mais agrémentées de motifs noirs et bruns foncés aux deux paires d'ailes.

Chenille : Petite oseille, Oseille des prés.



Grand nêgre des bois (*Minois dryas*)

Taille : 45-60 mm.
Brun noirâtre avec, aux ailes antérieures, 2 ocelles pupillés de bleu clair, plus petits chez le mâle que chez la femelle. Revers des ailes postérieures brun jaunâtre, avec une éclaircie médiane blanchâtre.
Chenille : Graminées.



Moirés (*ici Erebia medusa*)

Taille : 32-40 mm.
Ailes brun noirâtre, ornées chacune de 3 à 5 ocelles noirs, pupillés de blanc, et inscrits dans une macule fauve orangée. Revers semblable à la face supérieure.
Chenille : Graminées.



Tristan (*Aphantopus hyperantus*)

Taille : 35-42 mm.
Brun noirâtre, avec quelques ocelles faiblement indiqués chez le mâle, plus apparent chez la femelle. Revers brun roussâtre, orné de 7 à 9 ocelles cerclés de jaunes (de 2 à 4 aux ailes antérieures, 5 aux postérieures).
Chenille : Graminées.



Céphales (*Coenonympha arcania*)

Taille : 28-35 mm.
Ailes antérieures fauve, avec une bordure marginale brune. Ailes postérieures brun sombre, revers contrasté, traversé par une bande blanche, avec 4 ou 5 ocelles noirs pupillés de blanc, cerclés de fauve et de noir, et précédé d'un ocelle costal semblable.
Chenille : Graminées.



Goutte de sang (*Tyria jacobaeae*)

Taille : 32-42 mm.
Ailes antérieures noires, à faible éclat bleuâtre, avec une bande et deux points marginaux rouges. Ailes postérieures rouges, finement liserées de noir.
Chenille : Sénéçon jacobée, Tussilage, Pas d'âne, Pétasite officinale.



Écaille chinée (*Euplagia quadripunctaria*)

Taille : 45-55 mm.
Ailes antérieures crème, traversées par des bandes obliques noires. Ailes postérieures rouges écarlates, avec 3 ou 4 taches noires.
Chenille : Framboisier, Sauge des prés, Sénéçon, Ortie, Petite Pimprenelle, Vipérine commune.



Petit paon de nuit (*Saturnia pavonia*)

Taille : 60-85 mm.
Mâle avec les ailes antérieures brun rougeâtre, et les ailes postérieures jaunes orangées. Femelle plus grande que le mâle, grise.
Chenille : Prunellier, Saule marsault, Framboisier, Ronce frutescente, Spirée ulmaire, Myrtillier, Airelle des marais, Bruyère commune, Sauge des prés.



Grand paon de nuit (*Saturnia pyri*)

Taille : 105-140 mm.
Ornementation comparable au Petit paon de nuit, mais plus terne et plus sombre. Envergure nettement plus grande.
Chenille : Pommier, Prunier domestique, Châtaigner, Hêtre commun, Sycomore.



Sphinx à tête de mort (*Acherontia atropos*)

Taille : 80-120 mm.
Ailes supérieures brun sombre, ornées de motifs complexes noirs, blanc et brun ferrugineux. Ailes postérieures jaunes, avec deux bandes transversales noires. Abdomen jaune annelé de noir. Thorax orné d'un dessin jaune évoquant une tête de mort.
Chenille : Pomme de terre, Troène, Lilas commun, Chou.



Sphinx du liseron (*Agrius convolvuli*)

Taille : 80-120 mm.
Ailes antérieures gris brunâtre ornées de motifs complexes à base de stries longitudinales et de taches. Ailes postérieures marquées de bandes transversales sombres. Abdomen rose vif, annelé de noir. Trompe atteignant 8 à 10 cm.
Chenille : Liseron des champs.