

LES OISEAUX.

Les oiseaux nocturnes:

Les rapaces:

- La **chouette hulotte** a un plumage brun moucheté; les jeunes chouettes ont le corps recouvert d'un duvet épais de teinte gris pâle. Son régime alimentaire est très varié: elle se nourrit aussi bien de petits rongeurs (campagnol, souris, musaraigne) que de petits oiseaux, de serpents, de grenouilles et de gros insectes. Son nid est situé dans un trou d'arbre, un vieux nid d'écureuil ou de corneille, parfois dans le trou d'une muraille ou d'un rocher, voire un terrier de lapin.
- Le **hibou moyen duc** a un disque facial très net brun-fauve, bordé de noir et de gris. Les sourcils et les lores sont blancs. Le bec est noir. Les yeux sont orange ou jaune. La femelle est plus foncée, et plus grande que le mâle. Il se nourrit de petits mammifères tels que les campagnols, les lapereaux, les jeunes rats. Il peut aussi attraper de petits oiseaux, des petits serpents et des insectes. Il utilise un nid abandonné, fait avec des brindilles par une autre espèce.
- Le **petit duc scops** est un hibou à peine aussi gros qu'un merle. La partie supérieure de son corps est grise, plus ou moins roussâtre, finement striée de noir. Son disque facial gris séparé en deux par une bande sombre triangulaire de la calotte au bec noir bleuté, fait ressortir ses yeux ronds jaune-vert . Il se nourrit de gros insectes, de petits rongeurs, de lézards et de grenouilles. Son nid se trouve souvent dans le tronc d'un vieil arbre, dans une cavité creusée par un pic vert, pas trop près du sol.

Les oiseaux diurnes:

- Le **bec-croisé** vit dans les forêts de conifères; son nom vient de la forme de son bec. Son alimentation se compose de graines de résineux qu'il extrait des cônes à l'aide de son bec. Il mange également des baies, des bourgeons et les graines de feuillus, les pépins et la pulpe des fruits ainsi que des insectes.
- Le **casse-noix** martèle les noisettes et les cônes de pin cembro de son bec puissant. Il aime aussi les baies, les fruits secs et les petits invertébrés. Prévoyant, il enterre ses réserves dans des caches qu'il mémorise. L'hiver, il retrouve 80% des graines, même enfouies sous la neige.
- Le **geai des chênes** affectionne particulièrement les glands, mais il mange aussi des larves et des insectes. Comme le casse-noix, il stocke de la nourriture (glands, faines...) pour l'hiver. Il est à l'occasion prédateur d'autres oiseaux: il mange leurs œufs.
- La **mésange charbonnière** se nourrit essentiellement d'insectes en été, de graines, de baies et de fruits le reste de l'année.
- Le **pic épeiche** se nourrit de graines de conifères, noyaux, faines, noisettes et noix; il aime aussi les insectes et les larves du bois. Sur les arbres vermoulus, le pic frappe l'écorce de son bec pour y déloger les larves qui s'y cachent. Il a une grande langue munie de crochets qui lui permet d'attraper les larves dans les trous profonds de 10 cm. Au printemps, le pic épeiche perce une série de petits trous alignés dans l'écorce de jeunes arbres. De ces plaies s'écoule une sève sucrée qu'il lèche.
- Le **pic vert** se nourrit surtout au sol, fouillant la litière de la forêt à la recherche de fourmis, lombrics et larves d'insectes; Après avoir pratiqué un trou avec son bec, il y introduit sa langue gluante pourvue de petits crochets. Il mange aussi des graines, baies et fruits.

- La **sittelle torchepot** se nourrit de noisettes, noix et faines qu'elle coince dans des fissures d'écorces pour les picorer; avant l'hiver, elle fait des provisions qu'elle cache dans les fentes de l'écorce ou sous les feuilles mortes et la mousse. La sittelle mange également des baies, des graines de conifères, des chenilles et des fourmis.
- Le **tarin des aulnes** est essentiellement granivore, surtout les graines des feuillus tels l'orme, le bouleau ou l'aulne, mais il se nourrit aussi de graines de chardon ou de pissenlit. Plus exceptionnellement il se nourrit de baies et de bourgeons de résineux. Les juvéniles quant à eux, sont essentiellement nourris d'insectes.